

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России
«_23_» мая 2022 г. Протокол № 11

Председатель ученого совета,
ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России

_____ Д.О. Иванов

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
для обучающихся по основным образовательным программам высшего образования
(программам ординатуры) по специальности
31.08.35 – «Инфекционные болезни»**

уровень подготовки кадров высшей квалификации
Нормативный срок обучения – 2 года

Форма обучения
очная

Клиническая практика: 2592 часов

Санкт-Петербург
2022 г.

1. Требования к результатам освоения программы практики

В результате освоения программы практики ординатор должен

знать:

- Принципы организации инфекционной помощи населению;
- Вопросы экономики, управления и планирования в инфекционной службе;
- Вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при инфекционной патологии;
- Правовые основы деятельности врача инфекциониста;
- Организацию, формы и методы пропаганды медицинских и гигиенических знаний, профилактики заболеваний;
- Вопросы психологии профессионального общения, врачебной этики и деонтологии
- Эпидемиологические аспекты номенклатуры и классификации инфекционных болезней;
- Эпидемиологические исследования (эпидемиологический метод);
- Механизм развития и проявления эпидемического процесса при отдельных группах и нозологических формах инфекционных болезней;
- Профилактические и противоэпидемические мероприятия и организацию противоэпидемической работы, ее правовые основы;
- Эпидемиологию и профилактику наиболее распространенных инфекционных болезней.
- Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови, приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни, определение тактики ведения пациента с целью их предотвращения;
- Порядок оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни";
- Порядок оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее - ВИЧ);
- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи при инфекционных заболеваниях, стандарты медицинской помощи пациентам при инфекционных заболеваниях, санитарные нормы и правила;
- Номенклатуру медицинских услуг, относящихся к сфере инфекционных болезней;
- Методику сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных представителей) при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях;
- Методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);
- Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека в норме и у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в норме и у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) патологическими состояниями;
- Этиологию, эпидемиологию и патогенез инфекционных заболеваний;
- Современные классификации, клиническую симптоматику инфекционных заболеваний;
- Методы диагностики инфекционных заболеваний;
- Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ);
- Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях;
- Медицинские показания и медицинские противопоказания к использованию методов лабораторной диагностики пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской помощи в

- неотложной форме пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Принципы асептики и антисептики;
 - Условия выписки больных с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и санитарно-эпидемиологическими правилами;
 - Методы лечения пациентов при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
 - Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, применяемых при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях; медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные;
 - Методы немедикаментозного лечения инфекционных заболеваний; медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные;
 - Лечебное питание пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
 - Методику выполнения спинномозговой пункции;
 - Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
 - Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях, в том числе в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
 - Порядок организации медицинской реабилитации;
 - Основы медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями;
 - Методы медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями;
 - Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов вследствие перенесенных инфекционных заболеваний;
 - Механизм воздействия медицинских реабилитационных мероприятий на организм у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями;
 - Медицинские показания для направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов;
 - Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) их последствиями;
 - Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации;
 - Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации; порядок подтверждения их наличия или отсутствия, формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии)

- указанных заболеваний;
- Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции;
 - Порядок выдачи листов нетрудоспособности;
 - Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований;
 - Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
 - Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации;
 - Порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
 - Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
 - Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
 - Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению методов профилактики инфекционных заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, с учетом стандартов медицинской помощи;
 - Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями;
 - Основные принципы профилактического осмотра;
 - Медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортному лечению;
 - Порядки оказания паллиативной медицинской помощи;
 - Современные классификации, симптомы и синдромы неизлечимых прогрессирующих заболеваний и состояний;
 - Современные методы клинической диагностики неизлечимых прогрессирующих заболеваний и состояний;
 - Правила проведения и прекращения реанимационных мероприятий пациентам на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний;
 - Оказание психологической поддержки больным (их законным представителям и иным лицам, осуществляющим уход) с учетом индивидуальных особенностей поведения неизлечимого больного;
 - Основы трудового законодательства Российской Федерации, системы оплаты медицинской помощи, государственные гарантии оказания медицинской помощи;
 - Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "инфекционные болезни";
 - Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
 - Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии;
 - Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях инфекционного профиля;
 - Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных болезней;
 - Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания;
 - Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации;

- Принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; основы медицинской этики и деонтологии в инфектологии;
- Биологические и средовые факторы, влияющие на здоровье населения;
- Общественно значимые моральные нормы и основы нравственного поведения;
- Методологические и правовые основы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации;
- Общую характеристику и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций;
- Классификацию, определение и источники чрезвычайных ситуаций;
- Организацию защиты населения в очагах особо опасных инфекций;
- Основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах особо опасных инфекций, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени;
- Особенности оказания и организации помощи по борьбе с инфекционными болезнями в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах, террористических актах и локальных вооруженных конфликтах;
- Особенности медицинского снабжения организаций и формирований, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного характера.

уметь:

- Анализировать и оценивать инфекционную заболеваемость детского и взрослого населения и влияние на него факторов окружающей и социальной среды;
- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Проводить физикальное исследование пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях у пациентов с инфекционными заболеваниями;
- Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей;
- Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

- Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных исследований пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи в неотложной форме;
- Выявлять среди пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями коморбидную патологию (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем и крови), ее основные клинические проявления, способные вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход;
- Проводить дифференциальную диагностику болезней инфекционного профиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений), в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в условиях стационара, организовывать ее в соответствии с состоянием пациента;
- Разрабатывать план лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Обосновывать применение лекарственных препаратов, немедикаментозного лечения для пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Определять последовательность применения лекарственных препаратов, немедикаментозной терапии для пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

- Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, анализировать действие лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий;
- Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Назначать немедикаментозную терапию пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной терапии пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных исследований у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями, корректировать план лечения в зависимости от особенностей течения;
- Назначать лечебное питание пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Оценивать приверженность к лечению и риск преждевременного прекращения лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и выполнять внутривенное переливание крови и ее компонентов;
- Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Разрабатывать план мероприятий по реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Определять медицинские показания для направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

- Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе при реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов;
- Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое снижение трудоспособности, обусловленное инфекционными заболеваниями и (или) состояниями, для прохождения медико-социальной экспертизы
- Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого снижения трудоспособности, обусловленных инфекционными заболеваниями и (или) состояниями
- Выносить медицинские заключения по результатам медицинского освидетельствования, медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических, по вопросам наличия или отсутствия инфекционных заболеваний
- Выносить медицинские заключения по результатам медицинского освидетельствования о наличии или отсутствии у освидетельствуемого лица инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации;
- Осуществлять профилактические осмотры с целью выявления инфекционных заболеваний и (или) состояний;
- Проводить диспансерное наблюдение за пациентами при инфекционных заболеваниях и (или) состояниях;
- Производить санитарно-просветительную работу по формированию элементов здорового образа жизни;
- Оформлять и направлять экстренное извещение при выявлении инфекционного или профессионального заболевания, представлять внеочередные донесения о возникновении чрезвычайной ситуации
- Выносить медицинские заключения по результатам медицинского освидетельствования о наличии или отсутствии ВИЧ у освидетельствуемого лица;
- Определять медицинские показания для оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Направлять пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Оказывать паллиативную медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Оказывать психологическую поддержку больным (их законным представителям) и иным лицам, осуществляющим уход, с учетом индивидуальных особенностей поведения неизлечимого больного;
- Составлять план работы и отчет о своей работе;
- Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа;
- Использовать медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";

- Осуществлять контроль выполнением должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским персоналом;
- Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания
- Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
- Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)
- Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме

владеть навыками:

- Сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или) состояния, эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Физикального исследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);
- Направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями на лабораторное обследование в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями на инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Обоснования и постановки диагноза с учетом действующей МКБ;
- Обеспечения безопасности диагностических мероприятий для пациентов и медицинских работников;
- Разработки плана лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Назначения лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Назначения немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Оценки эффективности и безопасности немедикаментозной терапии пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Назначения лечебного питания пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

- Профилактики или лечения осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения;
- Выполнения рекомендаций по терапии, назначенной врачами-специалистами;
- Составления плана мероприятий медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующим порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Проведения мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов;
- Направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Оценки эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Оценки приверженности к лечению и риска преждевременного прекращения лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями;
- Работы по проведению медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических;
- Проведения экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и работа в составе врачебной комиссии медицинской организации, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности;
- Подготовки медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы;
- Направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций органов и систем организма человека, для прохождения медико-социальной экспертизы;
- Проведения работы по выполнению отдельных видов медицинских освидетельствований иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- Проведения работы по медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ;
- Назначения профилактических мероприятий с учетом факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическими правилами, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Организации и проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний;
- Определения медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий (карантина);

- Заполнения и направления экстренного извещения о случае инфекционного, паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- Организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "инфекционные болезни", в условиях чрезвычайной ситуации;
- Проведения диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими инфекционные заболевания, длительно и часто болеющими, и пациентами с хроническими инфекционными заболеваниями;
- Определения медицинских показаний для оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Направления пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Проведения работы по организации паллиативной медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;
- Оказания психологической поддержки больным (их законным представителям и иным лицам, осуществляющим уход) с учетом индивидуальных особенностей поведения неизлечимого больного;
- Составления плана и отчета о своей работе;
- Проведения анализа показателей инфекционной заболеваемости, инвалидности и смертности в медицинской организации и среди населения;
- Ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа;
- Контроля выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским персоналом;
- Проведения работы по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
- Использования медицинских информационных систем и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- Использования в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну;
- Оценки состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- Распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- Оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания));
- Применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме;

- Выполнения медицинских манипуляций в объеме, соответствующем требованиям квалификационной характеристики;
- Работы с медицинскими информационными ресурсами и поиска профессиональной информации в сети Интернет

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы практики по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни»

№ п/п	Номер/индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Этап формирования компетенции
Универсальные компетенции			
1	УК-1	готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Текущий Промежуточный
Профессиональные компетенции			
2	ПК-1	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	Текущий Промежуточный
3	ПК-2	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	Текущий Промежуточный
4	ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	Текущий Промежуточный
5	ПК-6	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	Текущий Промежуточный
6	ПК-8	готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	Текущий Промежуточный
7	ПК-9	готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих	Текущий Промежуточный

3. Соответствие формируемых компетенций задач освоения программы практики

Компетенции	Результаты освоения программы практики				
	Проведение обследования детей в целях выявления заболеваний инфекционного профиля, установления диагноза	Назначение лечения детям с заболеваниями инфекционного профиля, контроль его эффективности и безопасности	Назначение реабилитационных мероприятий детям с инфекционными заболеваниями и контроль их эффективности	Назначение мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни	Ведение медицинской документации, проведение анализа медико-статистической информации, организация деятельности подчиненного персонала
УК-1	+	+	+	+	+
ПК-1	+			+	
ПК-2	+				+
ПК-5	+				+
ПК-6		+			
ПК-8			+	+	
ПК-9				+	

4. Материалы оценки результатов обучения, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе практики (Б 2)

2 семестр

№	Индекс компетенции	Наименование контрольных мероприятий			
		Тестирование	Собеседование	Выполнение практических навыков	Решение задач
		Наименование материалов оценочных средств			
		Тесты	Вопросы собеседования	Алгоритмы практических навыков	Задачи
		№ задания			
1.	УК-1	1-150 201-264, 333-399, 401-475	1-91	1-20	2, 3, 4-9, 10-13, 19, 20
2.	ПК-1	8-27, 44, 55, 88-94, 133, 265-300, 401-416, 476-510, 546-549, 610-622, 721-722, 803-814	7-12, 22, 51-91	1-20	5, 12, 19, 20
3.	ПК-2	1-20, 88-94, 133, 301-332, 511-545, 550-555, 879	7-12, 22, 28-30	1-20	4, 5, 12, 19, 20
4.	ПК-5	1-27, 56, 30, 31, 42-45, 56 -61, 72-78, 80-87, 560-573, 556-559, 701-718, 723-743, 748-795, 815-848, 856-874, 880-886	12-91	1-20	2, 3, 10-13, 19, 20
5.	ПК-6	31-42, 70, 71, 79, 85, 108-109,	12-91	1-20	2, 3, 4-13, 19,

		129, 128, 574-585, 587-589, 590-597, 719-720, 849, 875-876, 878, 906			20
6.	ПК-8	456, 598-609	12-91	1-20	2, 3, 4-12, 19, 20
7.	ПК-10	442-475	12-91	1-20	2, 3, 4-12, 19, 20
8.	ПК-11	442-475, 634-679	12-91	1-20	2, 3, 4-12, 19, 20

3 семестр

№	Индекс компетенции	Наименование контрольных мероприятий			
		Тестирование	Собеседование	Выполнение практических навыков	Решение задач
		Наименование материалов оценочных средств			
		Тесты	Вопросы собеседования	Алгоритмы практических навыков	Задачи
		№ задания			
1.	УК-1	151-200	92-124	21-30	1, 14-17
2.	ПК-1	192-193, 856-874, 933-937	100, 101, 106, 107, 111, 112, 114, 121	21-30	1, 15
3.	ПК-2	162, 188, 887, 983-990	100, 101, 121, 124	21-30	1, 15
4.	ПК-5	157-169, 888-905, 907, 932, 941-943, 945-953	92-124	21-30	1, 14-17
5.	ПК-6	167-168, 178-180, 194, 938-940, 944, 954	92-124, 180-186	21-30	1, 14-17
6.	ПК-8	991-995	92-124	21-30	1, 14-17
7.	ПК-10	997-1005	92-124	21-30	1, 14-17
8.	ПК-11	634-679, 1006-1012	92-124	21-30	1, 14-17

2. Критерии оценки, шкалы оценивания

2.1. Критерии оценивания тестовых заданий:

«Отлично» - количество положительных ответов 91% и более максимального балла теста.

«Хорошо» - количество положительных ответов от 81% до 90% максимального балла теста.

«Удовлетворительно» - количество положительных ответов от 71% до 80% максимального балла теста.

«Неудовлетворительно» - количество положительных ответов менее 71% максимального балла теста.

2.2. Критерии оценивания ответов на вопросы устного собеседования:

«Отлично» - всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, основной и дополнительной литературы, взаимосвязи основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. Проявление творческих способностей в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» - полное знание учебного материала, основной рекомендованной к занятию. Обучающийся показывает системный характер знаний по дисциплине и способен к самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» - знание учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего освоения дисциплины, знаком с основной литературой, рекомендованной к занятию. Обучающийся допускает погрешности, но обладает необходимым знанием для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» - обнаруживаются существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускаются принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

2.3. Критерии оценивания выполнения алгоритма практического навыка:

«Отлично» - правильно определена цель навыка, работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий. Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено необходимое оборудование, все действия проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение наилучших результатов. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы. В представленном фрагменте медицинского документа правильно и аккуратно выполнены все записи, интерпретированы результаты.

Продемонстрированы организационно-трудовые умения (поддержание чистоты рабочего места и порядок на столе, экономное использование расходных материалов).

Навык осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

«Хорошо» - ординатор выполнил требования к оценке «5», но:

алгоритм проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной результативности, допустил два-три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета, алгоритм проведен не полностью или в описании допущены неточности, выводы сделаны неполные.

«Удовлетворительно» - ординатор правильно определил цель навыка; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы, подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу алгоритма провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения алгоритма были допущены ошибки в описании результатов, формулировании выводов.

Алгоритм проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или при оформлении документации были допущены в общей сложности не более двух ошибок не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ результатов; допущена грубая ошибка в ходе алгоритма (в объяснении, в оформлении документации, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.

«Неудовлетворительно» - не определена самостоятельно цель практического навыка; выполнена работа не полностью, не подготовлено нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; в ходе алгоритма и при оформлении документации обнаружилось в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; допущены две (и более) грубые ошибки в ходе алгоритма, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию преподавателя.

2.4. Критерии оценивания задачи:

«Отлично» - правильные ответы даны на все вопросы, выполнены все задания, ответы изложены логично и полно.

«Хорошо» - правильные ответы даны на все вопросы, выполнены все задания, полнота ответа составляет 2/3.

«Удовлетворительно» - правильные ответы даны на 2/3 вопросов, выполнены 2/3 заданий, большинство (2/3) ответов краткие, неразвернутые.

«Неудовлетворительно» - правильные ответы даны на менее 1/2 вопросов, выполнены менее 1/2 заданий, ответы краткие, неразвернутые, «случайные».

3. Оценочные средства

Тесты

1. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – ЭТО

- A. распространение инфекционных болезней среди животных
- B. распространение инфекционных болезней среди людей
- C. взаимодействие микро- и макроорганизма
- D. наличие возбудителей в воздухе или в воде

2. ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – ЭТО

- A. распространение инфекционных болезней среди животных
- B. распространение инфекционных болезней среди людей
- C. взаимодействие микро- и макроорганизма
- D. зараженность возбудителями переносчиков

3. ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ – ЭТО

- A. человек или животное
- B. человек
- C. насекомое
- D. инфицированный предмет

4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ЭПИДЕМИЯ

- A. по скорости распространения
- B. по числу больных
- C. по степени тяжести болезни
- D. по наличию летальных исходов

5. «АНТРОПОНОЗ» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО

- A. источником инфекции является человек
- B. заболевают люди
- C. источником инфекции являются животные
- D. источником инфекции являются как люди, так и животные

6. «ЗООНОЗ» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО

- A. источником инфекции является человек
- B. источником инфекции являются животные
- C. заболевают животные
- D. источником инфекции являются как люди, так и животные

7. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ К САПРОНОЗАМ ОТНОСИТСЯ

- A. чума
- B. гепатит А
- C. сальмонеллез
- D. легионеллез

8. ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ОЧАГОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. организм инфицированного человека
- B. объекты внешней среды, на которых возбудитель сохраняется
- C. объекты внешней среды, на которых возбудитель размножается
- D. территория с находящимся на ней источником инфекции, в пределах которой возможно заражение других людей

9. МЕРОПРИЯТИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ЗАЩИТУ ВОСПРИИМЧИВЫХ ЛИЦ, ЭТО

- A. дезинфекция
- B. отстранение от работы бактерионосителей из числа лиц эпидемиологически значимых профессий
- C. иммунопрофилактика
- D. наблюдение в течение максимального инкубационного периода

10. ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- A. в термостате
- B. в холодильнике
- C. в морозильной камере
- D. при комнатной температуре

11. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЫЯВЛЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ЛИЦ СЕРОНЕГАТИВНЫХ К СТОЛБНЯЧНОМУ ДИАГНОСТИКУМУ, НО СЕРОПОЗИТИВНЫХ К ДИФТЕРИЙНОМУ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- A. хорошей прививочной работы
- B. недостаточной иммунопрофилактики
- C. невыявленного эпидемического процесса дифтерии
- D. отсутствия эпидемического процесса дифтерии

12. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БОЛЕЕ 90 % СЕРОПОЗИТИВНЫХ ЛИЦ К СТОЛБНЯЧНОМУ И ДИФТЕРИЙНОМУ ДИАГНОСТИКУМАМ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- A. хорошей прививочной работы
- B. недостаточной иммунопрофилактики
- C. невыявленного эпидемического процесса дифтерии
- D. отсутствия эпидемического процесса дифтерии

13. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ СЕРОПОЗИТИВНЫХ ЛИЦ К СТОЛБНЯЧНОМУ И ДИФТЕРИЙНОМУ ДИАГНОСТИКУМАМ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- A. хорошей прививочной работы
- B. недостаточной иммунопрофилактики
- C. невыявленного эпидемического процесса дифтерии
- D. отсутствия эпидемического процесса дифтерии

14. УСЛОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. укус бездомной собаки
- B. укус лисицы
- C. укус известного животного
- D. ослюнение и царапины, нанесенные бездомной кошкой

15. ТУБЕРКУЛИН, ТУЛЯРИН, БРУЦЕЛЛИН ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

- A. активной иммунизации
- B. пассивной иммунизации
- C. выявления иммунитета
- D. для выявления аллергической перестройки организма

16. ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
- A. ослабленный вирус
 - B. инактивированный вирус
 - C. HBsAg
 - D. HBsAb
17. ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ОТМЕЧАЮТ ПОЯВЛЕНИЕ В КРОВИ
- A. HBs Ab
 - B. HBcor Ab
 - C. HBcor IgM
 - D. повышенных трансаминаз
18. ИСТОЧНИКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. больной человек
 - B. кровь больного
 - C. воздух комнаты, где находился больной
 - D. выделения из носоглотки больного
19. ИСТОЧНИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СЫПНОГО ТИФА МОГУТ БЫТЬ
- A. больной человек
 - B. зараженные вши
 - C. постельное белье больного
 - D. испражнения больного
20. ВЕДУЩИМ СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ ОТ БЕШЕНСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:
- A. химиопрофилактика
 - B. вакцинопрофилактика
 - C. дезинфекционные мероприятия
 - D. введение препаратов иммуноглобулинов
21. ВЕДУЩИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ДИЗЕНТЕРИИ ЗОННЕ ЯВЛЯЮТСЯ
- A. мясопродукты
 - B. молоко и молочные продукты
 - C. предметы обихода
 - D. вода
22. ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ЧУМЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ
- A. вши
 - B. блохи
 - C. клещи
 - D. слепни
23. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЯЕТСЯ
- A. химиопрофилактика
 - B. введение иммуноглобулинов
 - C. кесарево сечение
 - D. воздержание от грудного вскармливания
24. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ
- A. вакцинация

- В. введение иммуноглобулина
- С. химиопрофилактика
- Д. воздержание от грудного вскармливания

25. ПРИ ВВЕДЕНИИ ИММУННЫХ СЫВОРОТОК И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ОРГАНИЗМЕ РАЗВИВАЕТСЯ

- А. естественный активный иммунитет
- В. искусственный активный иммунитет
- С. естественный пассивный иммунитет
- Д. искусственный пассивный иммунитет

26. ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН В ОРГАНИЗМЕ РАЗВИВАЕТСЯ:

- А. естественный активный иммунитет
- В. искусственный активный иммунитет
- С. естественный пассивный иммунитет
- Д. искусственный пассивный иммунитет

27. ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ВАКЦИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. БЦЖ
- В. Энджерикс-В
- С. АКДС
- Д. АДС-М

28. К ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОТНОСИТСЯ:

- А. цикличность
- В. наличие возбудителя
- С. формирование иммунитета после перенесенного заболевания
- Д. контагиозность

29. СПЕЦИФИЧЕСКИМИ НАЗЫВАЮТ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ

- А. возбудителем данного заболевания и являющиеся следствием необычной выраженности клинических проявлений и морфофункциональных изменений
- В. микроорганизмами другого вида
- С. обострением хронических соматических заболеваний
- Д. присоединением острых соматических заболеваний

30. К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А. молекулярно-генетический метод
- В. гематологический метод
- С. ультразвуковой метод
- Д. инструментальный метод

31. ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРОТЕРАПИИ МОЖЕТ БЫТЬ

- А. анафилактический шок
- В. гиповолемический шок
- С. травматический шок
- Д. септический шок

32. К АНТИБИОТИКАМ ОТНОСЯТСЯ

- А. фторхинолоны
- В. цефалоспорины

- C. нитрофураны
- D. сульфаниламиды

33. К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

- A. антибактериальную терапию, регидратационную терапию, витаминотерапию
- B. этиотропную терапию, патогенетическую терапию, симптоматическую терапию
- C. противовирусную терапию, серотерапию, вакцинотерапию
- D. противопрозоюную терапию, противошоковую терапию, диуретическую терапию

34. ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ АНТИГЕНОВ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- A. вирус парагриппа
- B. риновирус
- C. вирус гриппа А
- D. аденовирус

35. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГРИППА

- A. пищевой
- B. трансмиссивный
- C. воздушно-капельный
- D. вертикальный

36. ПОРАЖЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГРИППЕ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО НА УРОВНЕ

- A. носа и его придаточных пазух
- B. гортани
- C. трахеи
- D. альвеол легких

37. ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПРИ РИНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ

- A. ринита
- B. трахеита
- C. ларингита
- D. тонзиллита

38. В 80 – 90% СЛУЧАЕВ ПЕРВИЧНЫЙ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС ПРОТЕКАЕТ

- A. в виде ОРВИ
- B. бессимптомно
- C. в виде экземы Капоши
- D. в виде генерализованной инфекции

39. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОРАЖЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1-ГО ТИПА

- A. слизистая оболочка половых органов
- B. губы
- C. кожа туловища
- D. кожа волосистой части головы

40. ТИПИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЫПИ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ

- A. папула
- B. везикула

- C. розеола
- D. петехия

41. МЕСТО ПЕРСИСТИРОВАНИЯ ВИРУСА HERPES ZOSTER В ОРГАНИЗМЕ

- A. слюнные железы
- B. миндалины
- C. чувствительные нервные ганглии
- D. кожа и слизистые оболочки

42. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТА

- A. бластов
- B. ретикулоцитов
- C. акантоцитов
- D. атипичных мононуклеаров

43. ТУПЫЕ ТЯНУЩИЕ БОЛИ В ОКОЛОУШНОЙ ОБЛАСТИ, ПРИПУХЛОСТЬ ПЕРЕД УШНОЙ РАКОВИНОЙ, ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ С НАКЛОНОМ В ПОРАЖЕННУЮ СТОРОНУ, СУХОСТЬ ВО РТУ ЯВЛЯЮТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ

- A. гриппа
- B. инфекционного мононуклеоза
- C. эпидемического паротита
- D. дифтерии

44. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

- A. проводится по эпидемическим показаниям
- B. входит в Национальный календарь профилактических прививок
- C. проводится по индивидуальным показаниям
- D. не проводится

45. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А ЯВЛЯЕТСЯ

- A. человек, больной острой формой заболевания
- B. животное
- C. человек, больной хронической формой заболевания
- D. все перечисленное

46. НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. вирус гепатита А
- B. вирус гепатита В
- C. вирус гепатита С
- D. вирус гепатита Е

47. МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНФИЦИРОВАННОЙ КРОВИ, ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В СОСТАВЛЯЕТ

- A. 10 мл
- B. 0,1 мл
- C. 1 мл
- D. 10 мл

48. МАРКЕРОМ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. лейкоцитоз
- B. увеличение СОЭ
- C. повышение уровня АлАТ
- D. повышение уровня креатинина

49. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е ЯВЛЯЕТСЯ

- A. высокая частота хронизации
- B. большая частота неблагоприятных исходов у беременных
- C. парентеральный механизм передачи
- D. склонность к эпидемическому распространению в регионах с холодным климатом

50. ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А С ПОЯВЛЕНИЕМ ЖЕЛТУХИ САМОЧУВСТВИЕ БОЛЬНОГО

- A. ухудшается
- B. улучшается
- C. остается прежним

51. В 80 – 90% СЛУЧАЕВ ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С ПРОТЕКАЕТ В ФОРМЕ

- A. субклинической или безжелтушной
- B. желтушной
- C. тяжелой с гипербилирубинемией
- D. цирроза печени

52. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- A. HBsAg
- B. HAV IgM
- C. HCV AB
- D. HDV AB

53. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. человек в любой фазе заболевания
- B. животное
- C. вода в бассейне
- D. предмет личной гигиены

54. К ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕ ОТНОСИТСЯ

- A. пищевой
- B. половой
- C. вертикальный
- D. парентеральный

55. НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В

- A. Западной Европе
- B. России
- C. Африке
- D. Северной Америке

56. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. копрограмма
- B. ректороманоскопия
- C. бактериологическое исследование испражнений
- D. бактериологическое исследование крови

57. ПРИСТУП ТРЕХДНЕВНОЙ МАЛЯРИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- A. 24 часа
- B. 36 часов
- C. 48 часов
- D. 72 часа

58. ПРИСТУП ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ МАЛЯРИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- A. 24 часа
- B. 36 часов
- C. 48 часов
- D. 72 часа

59. НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- A. лихорадкой
- B. болями в животе
- C. диареей
- D. рвотой и диареей одновременно

60. КЛИНИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- A. экзантемой
- B. гепатоспленомегалией
- C. олигурией
- D. болезненным мочеиспусканием

61. ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА ЖАЛОБ НА ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА, ОБЩУЮ СЛАБОСТЬ, КОЖНЫЙ ЗУД, ТЕМНУЮ МОЧУ, ЖЕЛТУШНОСТЬ КОЖИ И СКЛЕР, ОБЕСЦВЕЧЕННОСТЬ КАЛА, ТЯЖЕСТЬ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ, ОДНОКРАТНЫЙ ПОДЪЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ

- A. вирусный гепатит
- B. тропическую малярию
- C. токсический гепатит
- D. инфекционный мононуклеоз

62. ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ

- A. кровь больных
- B. вода
- C. слюна кровососущих насекомых
- D. медицинский инструментарий

63. ХАРАКТЕРНЫМ БИОХИМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ

- A. повышение уровня билирубина
- B. понижение сулемовой пробы
- C. повышение тимоловой пробы
- D. понижение протромбинового индекса

64. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ВИДЕ ЖЕЛТУХИ С ЗЕЛЕНОВАТЫМ ОТТЕНКОМ, КОЖНОГО ЗУДА, ГЕПАТОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ _____ СИНДРОМ

- A. цитолитический
- B. холестатический
- C. гепатопривный
- D. мезенхимально-воспалительный

65. БИОХИМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ ГЕПАТИТА

- A. повышение уровня билирубина
- B. повышение тимоловой пробы
- C. повышение аланинаминотрансферазы
- D. повышение уровня фибриногена

66. БИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, КОТОРЫЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- A. холестерин
- B. протромбиновый индекс
- C. непрямая фракция билирубина
- D. аланинаминотрансфераза

67. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А У РАННЕ НЕ БОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ В ОЧАГЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. введение иммуноглобулина
- B. введение препаратов интерферона-а
- C. вакцинация
- D. текущая дезинфекция

68. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ» ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ _____ АНТИТЕЛ К

- A. поджелудочной железе
- B. дезоксирибонуклеазе
- C. основному белку миелина
- D. цитоплазме печени и почек

69. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- A. щелочной фосфатазы
- B. непрямой фракции билирубина
- C. гаммаглутамилтранспептидазы
- D. прямой фракции билирубина

70. У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ЛЕЧЕНИИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В. И С ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕПАРАТЫ

- A. рибавирин
- B. интерферонов-а в свечах
- C. индукторов интерферонов
- D. пегелированных интерферонов

71. В ЛЕЧЕНИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С У ВЗРОСЛЫХ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ

- A. софосбувир
- B. балоксавир

- C. ламивудин
- D. периметавир

72. КАКОЙ ДИАГНОЗ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСКЛЮЧАТЬ МУЖЧИНЕ 29 ЛЕТ С ЖАЛОБАМИ НА СЛАБОСТЬ, СУБФЕБРИЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 37,5°C, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЖИДКИЙ СТУЛ ДО 2-3 РАЗ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ, ПОТЕРЮ ВЕСА БОЛЕЕ 10 КГ, ПРИЕХАВШЕМУ ИЗ НИГЕРИИ, ГДЕ НАХОДИЛСЯ В ДЛИТЕЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКЕ?

- A. лимфогрануломатоз
- B. бруцеллез
- C. ВИЧ-инфекция
- D. инфекционный мононуклеоз

73. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- A. слюна и слезы
- B. кровь и семенная жидкость
- C. грудное молоко и пот
- D. вагинальный секрет и моча

74. У БОЛЬНЫХ КАКИМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОСТРОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?

- A. кишечный иерсиниоз
- B. менингоэнцефаломиелит
- C. респираторный микоплазмоз
- D. инфекционный мононуклеоз

75. «ВОЛОСАТУЮ ЛЕЙКОПЛАКИЮ» ЯЗЫКА ВЫЯВЛЯЮТ У БОЛЬНЫХ

- A. ВИЧ-инфекцией
- B. инфекционным мононуклеозом
- C. распространенным кандидозом
- D. энтеровирусной инфекцией

76. ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ СКРИНИНГА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. иммуноферментный анализ
- B. полимеразная цепная реакция
- C. иммуногистохимический
- D. иммунохроматографический

77. У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕН С ПОМОЩЬЮ

- A. иммунограммы
- B. иммунохроматографии
- C. иммуногистохимии
- D. иммуноблотинга

78. БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НАЗНАЧАЮТ БИСЕПТОЛ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПИД-АССОЦИИРОВАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

- A. токсоплазмоза
- B. пневмоцистоза
- C. микоплазмоза

D. туберкулеза

79. В ЛЕЧЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ

- A. рибавирин
- B. пегинтрон
- C. боцепревир
- D. ламивудин

80. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ У НЕПРИВИТОГО РЕБЕНКА, БОЛЬНОГО ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ С ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ, ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНОЙ СЫПЬЮ СО СКЛОННОСТЬЮ К СЛИЯНИЮ НА ЛИЦЕ, ШЕЕ, ЗА УШАМИ, ЯВЛЕНИЯМИ РИНОФАРИНГИТА, КОНЪЮНКТИВИТА, ГИНГИВИТА И СТОМАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. краснуха
- B. корь
- C. скарлатина
- D. псевдотуберкулез

81. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЯВЛЕНИЯ ВЕЗИКУЛЕЗНОЙ СЫПИ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОРОЧЕК НА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ЛИЦЕ, ТУЛОВИЩЕ, А ТАКЖЕ АФТ НА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА У ПОДРОСТКА, ФЕБРИЛЬНО ЛИХОРАДЯЩЕГО ДО 39,5°C В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- A. герпетическая инфекция
- B. ветряная оспа
- C. энтеровирусная инфекция
- D. парвовирусная инфекция

82. ПОЯВЛЕНИЕ ОБИЛЬНОЙ МЕЛКОПЯТНИСТОЙ РОЗОВОЙ СЫПИ БЕЗ ТЕНДЕНЦИИ К СГУЩЕНИЮ НА НЕИЗМЕНЕННОМ КОЖНОМ ФОНЕ У ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА, БОЛЬНОГО 2-ОЙ ДЕНЬ С ОДНОКРАТНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 37,8°C, БОЛЕЗНЕННОСТЬЮ И УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАТЫЛОЧНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ ТРЕБУЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ

- A. краснухи
- B. кори
- C. скарлатины
- D. парвовирусной инфекции

83. У БОЛЬНОЙ 15 ЛЕТ, ЛЕЧИВШЕЙСЯ ДОМА ПО ПОВОДУ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ГРИППА, НА 6 ДЕНЬ БОЛЕЗНИ СОСТОЯНИЕ РЕЗКО УХУДШИЛОСЬ, ЛИХОРАДКА НАРОСЛА ДО 40°C, ПОЯВИЛИСЬ ОДЫШКА (ЧД – 36 В МИН), ГЛУХОСТЬ ТОНОВ СЕРДЦА, ТАХИКАРДИЯ (ДО 110 УДАРОВ В МИН), ЦИАНОЗ ГУБ, АУСКУЛЬТАТИВНО В НИЖНИХ ОТДЕЛАХ ЛЕГКИХ С ОБЕИХ СТОРОН – ВЛАЖНЫЕ МЕЛКОПУЗЫРЧАТЫЕ ХРИПЫ, ЧТО ХАРАКТЕРИЗОВАЛО РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ВИДЕ

- A. отека легких
- B. миокардита
- C. вторичной пневмонии
- D. бронхита с обструктивным синдромом

84. ДЛЯ КАКОГО ПЕРИОДА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОЧЕ: УДЕЛЬНЫЙ ВЕС –

1005, БЕЛОК – 1,32 Г/Л, В ОСАДКЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ – 10-15, ЛЕЙКОЦИТЫ – 2-3, СВЕЖИЕ ЭРИТРОЦИТЫ 30-40, ЦИЛИНДРЫ ГИАЛИНОВЫЕ – 4-6, ЗЕРНИСТЫЕ – 1-2, НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ КРЕАТИНИНА – 280 МКМОЛЬ/Л И МОЧЕВИНЫ – 19 ММОЛЬ/Л.

- A. начального
- B. олигурического
- C. полиурического
- D. реконвалесценции

85. В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА НЕОБХОДИМО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА

- A. цефотаксима
- B. ровамицина
- C. флемоксина
- D. доксициклина

86. КЛИНИКА СТЕНОЗА II СТЕПЕНИ ПРИ ОСТРОМ СТЕНОЗИРУЮЩЕМ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ У РЕБЕНКА 11 МЕС ПРИ ПАРАГРИППЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- A. инспираторной одышкой в покое, втяжением уступчивых мест грудной клетки, западением грудины, участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, цианозом, исчезающем в покое
- B. шумным вдохом с втяжением яремной ямки при беспокойстве ребенка
- C. общей бледностью, потливостью, цианозом губ, акроцианозом, парадоксальным пульсом
- D. экспираторной одышкой в покое, втяжением уступчивых мест грудной клетки, участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, цианозом, крепитирующими хрипами над поверхностью легких

87. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ И ПОРАЖЕНИЕМ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 2 ЛЕТ ЖИЗНИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЯВЛЯЕТСЯ

- A. вирус парагриппа
- B. аденовирус
- C. микоплазма пневмонии
- D. респираторно-синцитиальный вирус

88. БОЛЬНОЙ ПРИОБРЕТЕННОЙ КРАСНУХОЙ ПОДЛЕЖИТ ИЗОЛЯЦИИ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ _____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЭЛЕМЕНТА СЫПИ

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

89. БОЛЬНОЙ КОРЬЮ ПОДЛЕЖИТ ИЗОЛЯЦИИ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ _____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЭЛЕМЕНТА СЫПИ

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

90. БОЛЬНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРОТИТОМ ПОДЛЕЖИТ ИЗОЛЯЦИИ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ _____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ЛИХОРАДКИ, УВЕЛИЧЕНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ИЛИ ДРУГИХ)

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

91. ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ, НЕ БОЛЕВШИЕ КОРЬЮ, КРАСНУХОЙ И ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРОТИТОМ И НЕ ПРИВИТЫЕ ПРОТИВ ЭТИХ ИНФЕКЦИЙ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ В ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО БОЛЬНОГО И ДО _____ ДНЯ С МОМЕНТА ИЗОЛЯЦИИ ПОСЛЕДНЕГО

- A. 7
- B. 9
- C. 17
- D. 21

92. КОНТАКТНЫЕ ПО СКАРЛАТИНЕ ДОШКОЛЬНИКИ И ШКОЛЬНИКИ 1-2 КЛАССА ПОДЛЕЖАТ ИЗОЛЯЦИИ НА _____ ДНЕЙ

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 17

93. ИЗОЛЯЦИЮ БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ ДЕТЕЙ ПРОВОДЯТ НА _____ ДНЕЙ

- A. 5
- B. 7
- C. 14
- D. 25

94. ИЗОЛЯЦИЮ КОНТАКТНЫХ ПО КОКЛЮШУ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, РАБОТАЮЩИХ В ДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПОВ, ПРОВОДЯТ _____ ДНЕЙ

- A. 7
- B. 11
- C. 14
- D. 21

95. БЕЗ КАКОГО СИМПТОМА НЕ БЫВАЕТ СКАРЛАТИНЫ?

- A. лихорадки
- B. сыпи
- C. гиперемии и гипертрофии миндалин
- D. увеличения тонзиллярных лимфоузлов

96. ПРИЗНАКИ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ ЗЕВА ВКЛЮЧАЮТ

- A. яркую отграниченную гиперемию миндалин
- B. плотный налет, выходящий за пределы миндалин, на фоне отека миндалин и тканей мягкого неба
- C. плотный серовато-белый налет, покрывающий обе миндалины, не выходящий за их пределы
- D. гнойные фолликулы на гиперемированных, увеличенных в размерах миндалинах

97. СИМПТОМ МУРСОНА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ТИПИЧНОЙ ФОРМЫ

- A. кори
- B. скарлатины
- C. эпидемического паротита
- D. инфекционного мононуклеоза

98. СОЧЕТАНИЕ РАССТРОЙСТВ ЗРЕНИЯ В ВИДЕ «ТУМАНА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ» И ДИПЛОПИИ, ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ, РЕЗКОЙ СУХОСТИ ВО РТУ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- A. столбняка
- B. ботулизма
- C. сальмонеллеза
- D. пищевой токсикоинфекции

99. ЛИХОРАДКА, СХВАТКООБРАЗНЫЕ БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА, ЧАСТЫЙ ЖИДКИЙ СТУЛ С ПРИМЕСЬЮ КРОВИ И СЛИЗИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- A. холеры
- B. дизентерии
- C. ротавирусной инфекции
- D. пищевой токсикоинфекции

100. ЗАБОЛЕВАНИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ РЕЗКОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, БОЛЯМИ В ЖИВОТЕ, ЧАСТЫМ ЖИДКИМ ЗЛОВОННЫМ СТУЛОМ, НАПОМИНАЮЩИМ «БОЛОТНУЮ ТИНУ», ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- A. амебиазом
- B. дизентерией
- C. холерой
- D. сальмонеллезом

101. У БОЛЬНОГО С ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ, ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, У КОТОРОГО НА 4-Й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ ПОЯВИЛИСЬ БОЛИ В СУСТАВАХ, ОДУТЛОВАТОСТЬ И ГИПЕРЕМИЯ ЛИЦА, ШЕИ, КИСТЕЙ И СТОП, ЯРКО-КРАСНАЯ ПЯТНИСТО-ПАПУЛЛЕЗНАЯ СЫПЬ НА ТУЛОВИЩЕ И КОНЕЧНОСТЯХ, А ТАКЖЕ УРЧАНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ В ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ

- A. трихинеллез
- B. псевдотуберкулез
- C. брюшной тиф
- D. сальмонеллез

102. У БОЛЬНОГО, ДОСТАВЛЕННОГО В ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С СИМПТОМАМИ РАЗДРАЖЕНИЯ БРЮШИНЫ И ЭЛЕМЕНТАМИ СКУДНОЙ РОЗЕОЛЕЗНОЙ СЫПИ НА ГРУДИ И ЖИВОТЕ НА 12-Й ДЕНЬ ВЫСОКОЙ ЛИХОРАДКИ, ПЕРФОРАЦИЯ ЯЗВЫ КИШЕЧНИКА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ПЕРИТОНИТОМ, ВЕРОЯТНО ОБУСЛОВЛЕНА

- A. брюшным тифом
- B. клинической дизентерией
- C. гангренозным аппендицитом
- D. неспецифическим язвенным колитом

103. КАКОВА НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ КАТАРАЛЬНОГО АППЕНДИЦИТА И МЕЗАДЕНИТА С ПАКЕТАМИ УВЕЛИЧЕННЫХ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ, ОБНАРУЖЕННЫХ В ХОДЕ ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ

ОПЕРАЦИИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ НА ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ АППЕНДИЦИТ У БОЛЬНОГО С ЖАЛОБАМИ НА СИЛЬНЫЕ БОЛИ В ПРАВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ ОБЛАСТИ СО 2-ГО ДНЯ БОЛЕЗНИ, ПРОТЕКАВШЕЙ С ВЫСОКОЙ ЛИХОРАДКОЙ И ПОВТОРНЫМИ ОЗНОБАМИ?

- A. дизентерия
- B. амебиаз
- C. псевдотуберкулез
- D. брюшной тиф

104. СОЧЕТАНИЕ ЛИХОРАДКИ, ГОЛОВНОЙ БОЛИ, БОЛЕЗНЕННОСТИ В ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, СКУДНОЙ РОЗЕОЛЕЗНОЙ СЫПИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- A. брюшного тифа
- B. клещевого энцефалита
- C. клинической дизентерии
- D. висцеральной формы токсокароза

105. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВЫЗВАЛО У ПОДРОСТКА ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ БУФЕТЕ МЯСНЫХ КОТЛЕТ СИЛЬНУЮ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ХОЛОДНЫЙ ПОТ НА ФОНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 37,3°C, БОЛЬ В ЭПИГАСТРИИ, МНОГОКРАТНУЮ РВОТУ С ЖЕЛЧЬЮ, КОТОРАЯ ПРЕКРАТИЛАСЬ ПОСЛЕ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА?

- A. ботулизм
- B. сальмонеллез
- C. пищевая токсикоинфекция
- D. ротавирусный гастроэнтерит

106. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЯВЛЕНИЯ У РЕБЕНКА 10 ЛЕТ, ЧЕРЕЗ 1 ЧАС, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОН СЪЕЛ В БУФЕТЕ ПИРОЖНОЕ С КРЕМОМ, БУЛКУ И КОМПОТ ИЗ ФРУКТОВ, НЕДОМОГАНИЯ, РЕЗКОЙ СЛАБОСТИ, ТОШНОТЫ, РВОТЫ СЪЕДЕННОЙ ПИЩЕЙ, А ПОЗДНЕЕ ОБИЛЬНОГО ЖИДКОГО, ВОДЯНИСТОГО СТУЛА, НА ФОНЕ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 38,6°C ЯВЛЯЕТСЯ

- A. кампилобактериоз
- B. норовирусная инфекция
- C. сальмонеллезный гастроэнтерит
- D. стафилококковая пищевая токсикоинфекция

107. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРЮШНОГО ТИФА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОТСУТСТВИЕМ

- A. острого начала заболевания
- B. явлений гастроэнтерита
- C. частого развития перфораций язв кишечника и кровотечений
- D. выраженной интоксикации

108. ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ КАМПИЛОБАКТЕРИОЗОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- A. эритромицин
- B. пенициллин
- C. ампициллин
- D. фуразолидон

109. В ТЕРАПИИ СЕКРЕТОРНЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НЕ ПОКАЗАН

- A. сорбент
- B. лоперамид

- C. пробиотик
- D. ферментный препарат

110. НА ОСНОВАНИИ НАЛИЧИЯ У БОЛЬНОГО ГИПЕРПИРЕТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ, СОНЛИВОСТИ, СЛАБОСТИ, ГОЛОВНОЙ БОЛИ, ПОВТОРНОЙ РВОТЫ, НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ СЫПИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С НЕКРОЗОМ В ЦЕНТРЕ НА НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЕ ТУЛОВИЩА И НОГАХ, МОЖНО КЛИНИЧЕСКИ ЗАПОДОЗРИТЬ

- A. сыпной тиф
- B. менингококкцемию
- C. парвовирусную инфекцию
- D. геморрагическую лихорадку с почечным синдромом

111. ЛИХОРАДЯЩИЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ДО 38,5-39°C БОЛЬНОЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СОСТОЯНИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, В СОЗНАНИИ, У КОТОРОГО ПРИ ОСМОТРЕ ЗА УХОМ ВЫЯВЛЕН УЧАСТОК ГИПЕРЕМИИ ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ С ПРОСВЕТЛЕНИЕМ В ЦЕНТРЕ И УВЕЛИЧЕННЫЙ, БОЛЕЗНЕННЫЙ РЕГИОНАРНЫЙ ЛИМФОУЗЕЛ, СООБЩИВШИЙ, ЧТО ЗА МЕСЯЦ ДО ЗАБОЛЕВАНИЯ СНИМАЛ С СЕБЯ КЛЕЩА, С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПЕРЕНОСИТ КЛЕЩЕВОЙ

- A. анаплазмоз
- B. риккетсиоз
- C. боррелиоз
- D. энцефалит

112. У БОЛЬНОГО ПОДРОСТКА 13 ЛЕТ, У КОТОРОГО НА 2-Й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ, ПРОТЕКАВШЕЙ С ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ, РЕЗКИМ НАРУШЕНИЕМ САМОЧУВСТВИЯ И ВЫРАЖЕННЫМ МЕНИНГЕАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ, В ЛИКВОРЕ ВЫЯВЛЕН ЦИТОЗ 8000 /МКЛ (95% НЕЙТРОФИЛОВ), БЕЛОК 1,1 Г/Л, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ

- A. энтеровирусный менингит
- B. менингококковый менингит
- C. туберкулезный менингит
- D. субарахноидальное кровоизлияние с вторичным менингитом

113. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ПОЛИОМИЕЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- A. очаговых симптомов
- B. вялого асимметричного проксимального паралича
- C. генерализованных тонико-клонических судорог
- D. расстройства чувствительности, тазовых нарушений

114. ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ МЕНИНГИЗМ ОТ МЕНИНГИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- A. многократная рвота
- B. нормальный ликвор
- C. фебрильная лихорадка
- D. менингеальный синдром

115. ОСЛОЖНЕНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. гайморит
- B. острая гидроцефалия
- C. носовое кровотечение
- D. острый вялый парез

116. ОТМЕНУ АНТИБИОТИКОВ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ

- A. лимфоцитарном плеоцитозе менее 100 клеток в 1 мкл
- B. нормализации самочувствия
- C. нормализации температуры тела
- D. нейтрофильном плеоцитозе менее 100 клеток в 1 мкл

117. В КРУГ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПРИ ОСТРО ВОЗНИКШЕМ НАРУШЕНИИ ГЛОТАНИЯ У НЕПРИВИТОГО БОЛЬНОГО СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ

- A. энцефалит
- B. полиомиелит
- C. дифтерию
- D. инфекционный мононуклеоз

118. МЕНИНГИТ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ НА ОСНОВАНИИ

- A. выбухания большого родничка
- B. появления косоглазия
- C. вздутия живота
- D. развития гипотрофии

119. ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТАХ ЭНДОЛЮМБАЛЬНО ВВОДИТСЯ АНТИБИОТИК

- A. амикацин
- B. левомецетин
- C. тетрациклин
- D. ципрофлоксацин

120. ЭНЦЕФАЛИТ У ДЕТЕЙ МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ НА ОСНОВАНИИ ПОЯВЛЕНИЯ

- A. очаговых симптомов
- B. повторных рвот
- C. тонико-клонических судорог
- D. психомоторного возбуждения

121. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ НА ОСНОВАНИИ ПОЯВЛЕНИЯ

- A. тризма жевательных мышц
- B. тонико-клонических судорог
- C. спастического тетрапареза
- D. вялых парезов мышц шеи и верхних конечностей

122. ГИПЕРЕСТЕЗИЯ, БРАДИКАРДИЯ, РАССТРОЙСТВО ДЫХАНИЯ, КЛОНИЧЕСКИЕ СУДОРОГИ, ГИПЕРТЕРМИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- A. инфекционно-токсического шока
- B. анафилактического шока
- C. отека-набухания головного мозга
- D. синдрома Уотерхауза-Фридериксена

123. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ У БОЛЬНОГО ГЕМОМРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ, ПРОЯВИВШИМСЯ НА 4-Й ДЕНЬ ОЛИГУРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА РЕЗКОЙ БОЛЬЮ В ОБЛАСТИ ПОЯСНИЦЫ СПРАВА, УСИЛИВАВШЕЙСЯ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ, БОЛЬЮ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ, ТОШНОТОЙ,

ПОВТОРНОЙ РВОТОЙ, СЛАБОСТЬЮ, БЛЕДНОСТЬЮ, СНИЖЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЧАСТЫМ ПУЛЬСОМ СЛАБОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ

- A. разрыв почки
- B. азотемическую уремию
- C. острую сосудистую недостаточность
- D. желудочно-кишечное кровотечение

124. ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. воздействие отравляющих веществ
- B. аллергическая реакция на фармакологические препараты
- C. внешнее или внутреннее кровотечение
- D. воздействие экзотоксинов при инфекционной патологии

125. ТЯЖЕЛЫЙ ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ ОБУСЛОВЛЕН ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИЗ СЕМЕЙСТВА

- A. Koronaviridae
- B. Paramyxoviridae
- C. Picornaviridae
- D. Orthomyxoviridae

126. ПРИ РАЗВИТИИ СИНДРОМА ГАССЕРА НАБЛЮДАЕТСЯ

- A. острая печеночная недостаточность
- B. острая надпочечниковая недостаточность
- C. жировая дегенерация внутренних органов
- D. острая почечная недостаточность

127. СИНДРОМ КИША ПРИ ГРИППЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОСТРОЙ

- A. пароксизмальной тахикардией
- B. почечной недостаточностью
- C. печеночной недостаточностью
- D. надпочечниковой недостаточностью

128. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СТАРТОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКОМ ТИПЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. хлосоль
- B. гемодез
- C. реополиглюкин
- D. 10% раствор глюкозы

129. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СТАРТОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ ТИПЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. гемодез
- B. хлосоль
- C. реополиглюкин
- D. 5% раствор глюкозы

130. ЗАБОЛЕВАНИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ РЕЗКОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, ВЫСОКОЙ ЛИХОРАДКОЙ, БОЛЯМИ В ГРУДИ, КАШЛЕМ С КРОВЯНИСТОЙ МОКРОТОЙ И СКУДНЫМИ ФИЗИКАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ СО СТОРОНЫ ЛЕГКИХ, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- A. орнитозом

- В. легионеллезом
- С. чумой
- Д. туляремией

131. ЗАБОЛЕВАНИЕ, НАЧИНАЮЩЕЕСЯ С ПОЯВЛЕНИЯ ОБИЛЬНОГО ВОДЯНИСТОГО КАЛОВОГО СТУЛА, КОТОРЫЙ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НАПОМИНАЕТ РИСОВЫЙ ОТВАР БЕЗ КАЛОВОГО ЗАПАХА, ИМЕЕТ НАИБОЛЬШЕЕ КЛИНИЧЕСКОЕ СХОДСТВО С

- А. холерой
- В. дизентерией
- С. балантидиазом
- Д. сальмонеллезом

132. БОЛЬНОЙ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ, ЗАБОЛЕВШИЙ ОСТРО И ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, С ГИПЕРПИРЕТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ, ОЗНОБОМ, ГОЛОВНОЙ БОЛЮ, УВЕЛИЧЕННЫМ И БОЛЕЗНЕННЫМ ПАХОВЫМ ЛИМФОУЗЛОМ С НЕЧЕТКИМИ КОНТУРАМИ (ПРИЗНАКАМИ ПЕРИАДЕНИТА), БАГРОВО-КРАСНОЙ, ЛОСНЯЩЕЙСЯ КОЖЕЙ НАД БУБОНОМ, ВЕРОЯТНО, ПЕРЕНОСИТ

- А. туляремию, бубонную форму
- В. чуму, бубонную форму
- С. острый гнойный лимфаденит
- Д. доброкачественный лимфоретикулез

133. ЛИЦ, КОНТАКТНЫХ С БОЛЬНОМ ЧУМОЙ, НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ НА _____ ДНЕЙ

- А. 5
- В. 7
- С. 10
- Д. 14

134. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧУМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. тетрациклины
- В. аминопенициллины
- С. 14-членные макролиды
- Д. цефалоспорины 3 поколения

135. СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОЙ ЛИХОРАДКИ, СИЛЬНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ С НАЛИЧИЕМ РОЗЕОЛЕЗНО-ПЕТЕХИАЛЬНОЙ СЫПИ НА ТУЛОВИЩЕ И СГИБАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А. паратифа А
- В. брюшного тифа
- С. клещевого сыпного тифа
- Д. вшивого сыпного тифа

136. СОЧЕТАНИЕ У БОЛЬНОГО ЛИХОРАДКИ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА

- А. лептоспироз
- В. трихинеллез
- С. сальмонеллез
- Д. трихоцефалез

137. ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ В ИЮНЕ У ЖИТЕЛЯ ПРИГОРОДА ХАБАРОВСКА, ПРОЯВЛЯВШЕЕСЯ ВЫСОКОЙ ЛИХОРАДКОЙ, СИЛЬНЫМИ ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ, ГИПЕРЕМИЕЙ ЛИЦА, ИНЪЕКЦИЕЙ СОСУДОВ СКЛЕР, НАЛИЧИЕМ ОБИЛЬНОЙ ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНОЙ СЫПИ НА ТУЛОВИЩЕ И РАЗГИБАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТОМ ПОД КОРОЧКОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ДО СМ НА ИНФИЛЬТРИРОВАННОМ ОСНОВАНИИ НА КОЖЕ ГРУДИ У ЛЕВОГО СОСКА, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЛОСЬ

- A. ГЛПС
- B. болезнью Лайма
- C. лептоспирозом
- D. клещевым сыпным тифом

138. У БОЛЬНОГО, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОГО С ЖАЛОБАМИ НА ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА (39°C), ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, БОЛИ В МЫШЦАХ, ПЛОХОЙ АППЕТИТ, ОДУТЛОВАТОСТЬ И ГИПЕРЕМИЮ ЛИЦА И ШЕИ, КРОВОИЗЛИЯНИЕ В СКЛЕРУ ПРАВОГО ГЛАЗА, РЕЗКУЮ БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ МЫШЦ БЕДРА И ГОЛЕНИ С НАЛИЧИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СИМПТОМА ПОКОЛАЧИВАНИЯ С ОБЕИХ СТОРОН, СЛЕДУЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ

- A. трихинеллез
- B. лептоспироз
- C. сальмонеллез
- D. клещевой энцефалит

139. У ПАЦИЕНТА 16 ЛЕТ, КОТОРЫЙ ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗ ТУРПОХОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ, ГДЕ ЖИЛ В ПАЛАТКЕ, ПИЛ ВОДУ ИЗ РУЧЬЯ, НА 20 СУТКИ ОТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ ОСТРО ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА ДО 39,5°C, ПОЯВИЛИСЬ БОЛИ В ГЛАЗНЫХ ЯБЛОКАХ, В ПОЯСНИЦЕ, НА 6-Й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ РВОТА, ОТМЕЧАЛОСЬ СНИЖЕНИЕ ДИУРЕЗА, НА КОЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕМОМРАГИЧЕСКОЙ СЫПИ, ЧТО, ВЕРОЯТНО, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ У НЕГО

- A. ботулизма
- B. омской лихорадки
- C. клещевого энцефалита
- D. геморрагической лихорадки с почечным синдромом

140. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ У ВЕТЕРИНАРНОГО САНИТАРА, УЧАСТВОВАВШЕГО В ЗАБОЕ БОЛЬНОЙ КОРОВЫ, ЕСЛИ НА ФОНЕ ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКИ У НЕГО НА БОЛЬШОМ ПАЛЬЦЕ ПРАВОЙ, РЕЗКО ОТЕЧНОЙ КИСТИ ОБНАРУЖЕНА РАНА ЯРКО-КРАСНОГО ЦВЕТА, ПОКРЫТАЯ ЧЕРНЫМ СТРУПОМ, А В ПРАВОЙ ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕН ПАКЕТ УВЕЛИЧЕННЫХ БЕЗБОЛЕЗНЕННЫХ ЛИМФОУЗЛОВ?

- A. туляремию
- B. бруцеллез
- C. сибирскую язву
- D. инфицированную рану, лимфаденит

141. ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОСТРО РАЗВИВШЕЕСЯ У ГЕОЛОГА, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕДИЦИЙ ПИЛ ВОДУ ИЗ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ, ПРОЯВИВШЕЕСЯ ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ ДО 39°C, БОЛЬЮ В ГОРЛЕ ПРИ ГЛОТАНИИ, НЕРЕЗКО ГИПЕРЕМИРОВАННОЙ СЛИЗИСТОЙ РОТОГЛОТКИ, НАЛИЧИЕМ НА ЛЕВОЙ ГИПЕРТРОФИРОВАННОЙ МИНДАЛИНЕ ПЛОТНОГО СЕРОВАТО-ЖЕЛТОГО НАЛЕТА, СНИМАЮЩЕГОСЯ С ТРУДОМ, А ТАКЖЕ БОЛЕЗНЕННОСТЬЮ ШЕИ СЛЕВА ЗА СЧЕТ

УВЕЛИЧЕННЫХ ДО 3 СМ В ДИАМЕТРЕ ЗАДНЕШЕЙНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ, ПОДВИЖНЫХ, БОЛЕЗНЕННЫХ, КОЖА НАД КОТОРЫМИ НЕ ИЗМЕНЕНА, ВЕРОЯТНО, ЯВЛЯЕТСЯ

- A. туляремией
- B. дифтерией ротоглотки
- C. стрептококковым тонзиллитом
- D. инфекционным мононуклеозом

142. ЗАБОЛЕВАНИЕ У ПАЦИЕНТА, ПРИЕХАВШЕГО ИЗ НИГЕРИИ, ГДЕ У НЕГО В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ ОТМЕЧАЛАСЬ ЕЖЕДНЕВНАЯ ЛИХОРАДКА С ПОВТОРНЫМИ ОЗНОБАМИ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, РВОТА, ДИАРЕЯ 2-3 РАЗА В ДЕНЬ, НА 6-Й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОГО В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР С ЛИХОРАДКОЙ ДО 39°C, ОЗНОБОМ, БЛЕДНОСТЬЮ КОЖИ, ИКТЕРИЧНОСТЬЮ СКЛЕР, УВЕЛИЧЕННЫМИ ДО 3 СМ ПЛОТНОЙ СЕЛЕЗЕНКОЙ И ДО 2 СМ ИЗ-ПОД КРАЯ РЕБЕРНОЙ ДУГИ ПЕЧЕНЬЮ, ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ

- A. геморрагической лихорадке
- B. тропической малярии
- C. вирусному гепатиту E
- D. генерализованной форме сальмонеллеза

143. У БОЛЬНОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЯСНОМ СОЗНАНИИ, С НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА, С ВЕДУЩИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ БОЛЕЗНИ В ВИДЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СУДОРОГ МЫШЦ ТУЛОВИЩА, РАСТЯЖУТОМ В УЛЫБКЕ РТОМ, МЫШЕЧНЫМ ГИПЕРТОНУСОМ, НАЛИЧИЕМ НА ЛЕВОЙ КИСТИ СЛЕДА ОЖОГА IV СТЕПЕНИ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ, ВЕРОЯТНО, ИМЕЕТ МЕСТО

- A. бешенство
- B. столбняк
- C. энцефалит
- D. раневой ботулизм

144. У ПАЦИЕНТКИ 30 ЛЕТ, ЗАБОЛЕВШЕЙ 7 ДНЕЙ НАЗАД, НА 2-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРИЕЗДА ИЗ УЗБЕКИСТАНА, ГДЕ УПОТРЕБЛЯЛА СЫРОЕ МОЛОКО, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ С ЖАЛОБАМИ НА БОЛИ В МЫШЦАХ, КОЛЕННЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВАХ, ПОВТОРНЫЕ ОЗНОБЫ, ПОТЫ, ЛИХОРАДКУ ДО 39,2°C, ВЫЯВЛЕННОЙ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ, НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСКЛЮЧАТЬ

- A. лептоспироз
- B. иерсиниоз
- C. бруцеллез
- D. висцеральный лейшманиоз

145. ЗАБОЛЕВАНИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ РЕЗКИМ ПОДЪЕМОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 40°C С СИЛЬНЫМ ОЗНОБОМ В ТЕЧЕНИЕ 4-6 ЧАСОВ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ СНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОБИЛЬНЫМ ПОТООТДЕЛЕНИЕМ, С ПОВТОРЕНИЕМ АНАЛОГИЧНЫХ ПРИСТУПОВ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО ВЕЧЕРАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ПОТЯСАЮЩИМ ОЗНОБОМ, ПОТОМ, СИЛЬНОЙ ГОЛОВНОЙ И МЫШЕЧНОЙ БОЛЬЮ, ИНОГДА РВОТОЙ, ПО КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ СООТВЕТСТВУЕТ

- A. сепсису
- B. лептоспирозу
- C. трехдневной малярии
- D. острому бруцеллезу

146. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ТРОПИЧЕСКОЙ МАЛЯРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. P. vivax
- B. P. ovale
- C. P. malariae
- D. P. falciparum

147. КАКУЮ ТЕРАПИЮ МОЖНО СЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛЯ БОЛЬНОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В ОЛИГУРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД, У КОТОРОГО ОТМЕЧАЕТСЯ ТОШНОТА, МНОГОКРАТНАЯ РВОТА, ИКОТА, ПОЯВИЛАСЬ СОНЛИВОСТЬ, НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПОДЕРГИВАНИЯ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, МЫШЦ РУК, КОЛИЧЕСТВО ВЫДЕЛЯЕМОЙ МОЧИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 50 МЛ В СУТКИ, БЫСТРО НАРАСТАЕТ УРОВЕНЬ МОЧЕВИНЫ И КРЕАТИНИНА В КРОВИ?

- A. гемосорбция
- B. лазикс и маннитол в высоких дозах
- C. экстракорпоральный гемодиализ
- D. паранефральная новокаиновая блокада

148. У БОЛЬНОГО, ПОЛУЧИВШЕГО ГЛУБОКУЮ КОЛОТУЮ РАНУ ПРАВОЙ СТОПЫ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, У КОТОРОГО ЧЕРЕЗ 12 ДНЕЙ ПОЯВИЛИСЬ НЕДОМОГАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ И ПОДЕРГИВАНИЕ МЫШЦ ВОКРУГ РАНЫ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТРУДНЕНИЕМ ЖЕВАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ РТА, БОЛЕЗНЕННОСТЬЮ ПРИ ГЛОТАНИИ, НАПРЯЖЕНИЕМ МЫШЦ ЛИЦА И ЧУВСТВОМ СТЕСНЕНИЯ В ГРУДИ, СЛЕДУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСКЛЮЧАТЬ

- A. столбняк
- B. ботулизм
- C. энцефалит
- D. бешенство

149. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧАТЬ ПОДРОСТКУ, МЕСЯЦ НАЗАД ОТДЫХАВШЕМУ В КАРЕЛИИ, И СНИМАВШЕГО С СЕБЯ КЛЕЩА ВО ВРЕМЯ ПОХОДА В ЛЕС, ЕСЛИ У НЕГО НА ФОНЕ ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКИ ДО 39°C В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРАВОЙ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ ПАЛЬПИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕННЫЙ, БОЛЕЗНЕННЫЙ ЛИМФОУЗЕЛ., РЯДОМ С КОТОРЫМ УЧАСТОК ГИПЕРЕМИИ ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ. С ПРОСВЕТЛЕНИЕМ В ЦЕНТРЕ?

- A. клещевой риккетсиоз
- B. клещевой энцефалит
- C. клещевой боррелиоз
- D. туляремия

150. У БОЛЬНОГО 18 ЛЕТ, 7 ДНЕЙ НАЗАД ПЕРЕНЕСШЕГО НЕТЯЖЕЛУЮ РЕСПИРАТОРНУЮ ИНФЕКЦИЮ, ЗАБОЛЕВШЕГО ОСТРО С ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 40°C И ПОЯВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ МЕЛКОТОЧЕЧНОЙ СЫПИ НА КОЖЕ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ И ДРУГИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСКЛЮЧАТЬ _____ ИНФЕКЦИЮ

- A. парвовирусную
- B. аденовирусную
- C. гриппозную
- D. менингококковую

151. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОТЛИЧИЕМ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ПОЛИОМИЕЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. наличие очаговых симптомов
- B. развитие генерализованных судорог
- C. развитие вялого асимметричного, преимущественно проксимального паралича в течение 24-72 часов
- D. наличие пирамидных знаков, расстройства чувствительности, тазовых нарушений

152. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОТЛИЧИТЬ СОСТОЯНИЕ МЕНИНГИЗМА ОТ МЕНИНГИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- A. низкий уровень белка в ликворе
- B. нормальный состав ликвора
- C. лимфоцитарный плеоцитоз
- D. менингеальные симптомы

153. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ЭПИГЛОТТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. *Neisseria catarrhalis*
- B. *Moraxella catarrhalis*
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. *Haemophilus influenzae*

154. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ХАРАКТЕРНО

- A. резкое затруднение носового дыхания
- B. обильные выделения из носа
- C. сухой навязчивый кашель
- D. конъюнктивит

155. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВИРУСОВЫДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- A. парагриппа
- B. аденовирусной инфекции
- C. коронавирусной инфекции
- D. гриппа В

156. ПРИ РАЗВИТИИ СИНДРОМА ГАССЕРА НАБЛЮДАЕТСЯ

- A. жировая дегенерация внутренних органов
- B. острая почечная недостаточность
- C. острая надпочечниковая недостаточность
- D. острая печеночная недостаточность

157. МАРКЕРОМ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ АКТИВНОЙ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР (ВЭБ) В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. IgG к капсидному антигену ВЭБ
- B. IgG к раннему антигену ВЭБ
- C. IgG к нуклеарному антигену ВЭБ
- D. ДНК ВЭБ в слюне

158. ПРИ ВРОЖДЕННОЙ КРАСНУХЕ РЕБЕНОК СЧИТАЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ

- A. первые две недели
- B. 1 месяц после рождения
- C. 6 месяцев
- D. 12 мес

159. К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ КОКЛЮША НЕ ОТНОСЯТ

- A. Серозный менингит

- В. Апноэ
- С. Кровоизлияние в склере
- Д. Пневмоторакс

160. К ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМАМ ПЕРИОДА РАЗГАРА КОКЛЮША ОТНОСЯТ

- А. лихорадку
- В. экспираторную одышку
- С. ринорею
- Д. приступообразный кашель с репризами

161. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД КОКЛЮША ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А. постепенно нарастающим сухим кашлем на фоне нормальной температуры тела
- В. острым началом с затрудненным вдохом, осипшим голосом, грубым, «лающим» кашлем
- С. приступообразным кашлем с постепенным нарастанием экспираторной одышки
- Д. сухим кашлем на фоне фебрильной лихорадки

162. ПРИЗНАКИ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ВКЛЮЧАЮТ

- А. яркую отграниченную гиперемию миндалин
- В. налет, выходящий за пределы миндалин, на фоне отека миндалин и тканей мягкого неба
- С. зернистость задней стенки глотки с гнойными выделениями, стекающими по задней стенке глотки
- Д. геморрагическую энантему на мягком небе

163. К РЕЗИДУАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА НЕ ОТНОСЯТ

- А. сахарный диабет,
- В. артрит
- С. ожирение
- Д. бесплодие

164. СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. серозный менингит
- В. пневмония
- С. миокардит
- Д. артрит

165. ФОРМОЙ ОСТРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГЕРПЕСА 6 ТИПА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А. внезапная экзантема
- В. афтозный стоматит
- С. инфекционная эритема
- Д. менингоэнцефалит

166. ДЛЯ ОСТРОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

- А. сиалоаденит
- В. гастроэнтерит
- С. везикулезные экзантема
- Д. афтозный стоматит

167. В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- A. Осельтамивир
- B. Ганцикловир
- C. Ламивудин
- D. Ацикловир

168. ТИПИЧНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОГРАММЫ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- A. гипохромная анемия
- B. резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево до палочкоядерных и юных форм нейтрофилов
- C. гиперлейкоцитоз с резко повышенной СОЭ
- D. лимфоцитоз с атипичными мононуклеарами

169. КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ КРУГА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ?

- A. стрептококковый тонзиллит
- B. дифтерия ротоглотки
- C. колиэнтерит
- D. аденовирусная инфекция

170. ДЛЯ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

- A. стенозирующего ларинготрахеита
- B. афтозного стоматита
- C. мелкопятнистой экзантемы
- D. фарингоконъюнктивальной лихорадки

171. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПАРАГРИППА ХАРАКТЕРНЫ СИМПТОМЫ

- A. ринита
- B. ларингита
- C. тонзиллита
- D. аденоидита

172. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ БОКАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНЫ СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ _____ СИСТЕМ

- A. респираторной и желудочно-кишечной
- B. желудочно-кишечной и мочевыделительной
- C. респираторной и мочевыделительной
- D. респираторной и центральной нервной

173. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА (ТОРС, SARS) ПРИЗНАН

- A. энтеровирус
- B. коронавирус
- C. аденовирус
- D. бокавирус

174. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ С ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _____ ИНФЕКЦИИ

- A. риновирусной
- B. аденовирусной
- C. коронавирусной

D. микоплазменной

175. РАЗВИТИЕ ПНЕВМОНИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ

- A. Гриппа
- B. Парагриппа
- C. Энтеровирусом
- D. Парвовирусом

176. ВЫРАЖЕННЫЙ ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- A. респираторно-синцитиальной инфекции
- B. кори
- C. краснухи
- D. коклюша

177. В ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ГРИППА В ИСПОЛЬЗУЮТ _____

- A. ацикловир
- B. римантадин
- C. софосбувир
- D. осельтамивир

178. ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ВОЗМОЖНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ

- A. осельтамивир
- B. ацикловир
- C. ремантадин
- D. ламивудин

179. ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВИРУСОМ

- A. гриппа
- B. парагриппа
- C. риновирусом
- D. аденовирусом

180. ДЛЯ ПАССИВНОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕПАРАТ

- A. инфликсимаб
- B. паливизумаб
- C. ритуксимаб
- D. рибавирин

181. КЛИНИКА СТЕНОЗА ГОРТАНИ I СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- A. одышкой и шумным дыханием в покое
- B. одышкой и шумным дыханием при беспокойстве, физической нагрузке
- C. вялостью, адинамией
- D. акроцианозом

182. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗА ГОРТАНИ 1-2 СТЕПЕНИ ПРИ ОРВИ У ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. лоратадин

- В. фенотерол
- С. будесонид
- Д. дексаметазон

183. ДЛЯ СИНДРОМА АКТИВАЦИИ МАКРОФАГОВ (ИЛИ ГЕМОФАГОЦИТАРНОГО СИНДРОМА) ХАРАКТЕРНЫ

- А. стойкая фебрильная лихорадка и цитопения с вовлечением 2-х и более ростков кроветворения
- В. стойкая фебрильная лихорадка, лейкоцитоз, тромбоцитоз
- С. периодическая фебрильная лихорадка с высоким уровнем С-реактивного белка
- Д. постоянная субфебрильная лихорадка с лимфоцитозом

184. СТАРТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А. аминопенициллином
- В. цефалоспорином 3 поколения
- С. аминогликозидом
- Д. 14-членным макролидом

185. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. гепатит
- В. панкреатит
- С. энцефалит
- Д. перитонит

186. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ИЗ ГРУППЫ

- А. пенициллинов
- В. макролидов
- С. цефалоспоринов
- Д. аминогликозидов

187. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Микоплазма пневмонии
- В. Пневмококк
- С. Респираторно-синцитиальный вирус
- Д. Пневмоциста пневмонии

188. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- А. иммунограмму, ф.50, ферритин
- В. клинический анализ крови, ф. 50, АлТ
- С. определение ДНК ВЭБ в крови, ф. 50, АлТ
- Д. определение антител к ВЭБ, ДНК ВЭБ в слюне, ф. 50

189. ПРИЧИНОЙ ЭОЗИНОФИЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ В ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А. респираторный микоплазмоз

- В. висцеральный токсокароз
- С. гиповитаминоз
- Д. респираторный хламидиоз

190. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНО _____

- А. инспираторная одышка
- В. тахипноэ
- С. экспираторная одышка
- Д. одышка смешанного характера

191. ТЕРАПИЯ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ

- А. Десенсибилизирующие средства
- В. Антибиотики
- С. Ингаляции препаратов из группы β 2-адреномиметиков
- Д. Противовоспалительные средства

192. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ:

- А. рвоты
- В. лихорадка выше 39,0
- С. судорог
- Д. кашлевых пароксизмов

193. ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ГРИППА

- А. ожирение
- В. гипотрофия
- С. активное курение
- Д. пассивное курение

194. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСТРЫЙ _____

- А. бронхит
- В. пневмония
- С. ринофарингит
- Д. ларинготрахеит

195. СЫПЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ ОБЫЧНО СВЯЗАНА С ПРИЕМОМ

- А. парацетамола
- В. амоксициллина
- С. азитромицина
- Д. аскорбиновой кислоты

196. С ВИРУСОМ ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА 8 ТИПА СВЯЗЫВАЮТ РАЗВИТИЕ

- А. рака шейки матки
- В. меланомы
- С. саркомы Капоши
- Д. лимфомы Беркитта

197. С ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА-БАРР СВЯЗЫВАЮТ РАЗВИТИЕ

- А. рака шейки матки

- В. саркомы Капошли
- С. лимфомы Беркитта
- Д. гепатоцеллюлярной карциномы

198. ГЕРПЕТИФОРМНАЯ ЭКЗЕМА КАПОШИ РАЗВИВАЕТСЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ДЕРМАТОЗОМ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ВИРУСОМ ГЕРПЕСА

- А. 1 типа
- В. 4 типа
- С. 6 типа
- Д. 8 типа

199. ВАКЦИНОТЕРАПИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

- А. герпетической инфекции
- В. ветряной оспы
- С. инфекционного мононуклеоза
- Д. цитомегаловирусной инфекции

200. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА 4 МЕСЯЦЕВ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС И ОРГАНА СЛУХА В КАЧЕСТВЕ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЕНИЕ

- А. виферона
- В. неоцитотекта
- С. ацикловира
- Д. ганцикловира

401. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЫЯВЛЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ЛИЦ СЕРОНЕГАТИВНЫХ К ПАРОТИТНОМУ ДИАГНОСТИКУМУ, НО СЕРОПОЗИТИВНЫХ К КРАСНУШНОМУ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- А. хорошей прививочной работы
- В. недостаточной иммунопрофилактики
- С. невыявленного эпидемического процесса краснухи
- Д. отсутствия эпидемического процесса краснухи

402. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БОЛЕЕ 90 % СЕРОПОЗИТИВНЫХ ЛИЦ К КОРЕВОМУ И КРАСНУШНОМУ ДИАГНОСТИКУМАМ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- А. ХОРОШЕЙ ПРИВИВОЧНОЙ РАБОТЫ
- В. недостаточной иммунопрофилактики
- С. невыявленного эпидемического процесса краснухи
- Д. отсутствия эпидемического процесса кори

403. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ СЕРОПОЗИТИВНЫХ ЛИЦ К КРАСНУШНОМУ И КОРЕВОМУ ДИАГНОСТИКУМАМ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- А. хорошей прививочной работы
- В. недостаточной иммунопрофилактики
- С. невыявленного эпидемического процесса краснухи
- Д. отсутствия эпидемического процесса кори

404. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПОКАЗАНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ:

- А. в первые 24 часа после рождения
- В. в 3 мес
- С. в 6 мес

- D. после 12 мес
405. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПОКАЗАНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОКЛЮША:
- A. в первые 24 часа после рождения
 - B. в 1.5 мес
 - C. в 2 мес
 - D. в 3 мес
406. ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА А ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
- A. ослабленный вирус
 - B. инактивированный вирус
 - C. убитый формалином
 - D. живой вирус
407. ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА А ОТМЕЧАЮТ ПОЯВЛЕНИЕ:
- A. РНК НАV В КРОВИ
 - B. Hbcor AB
 - C. НАVAB
 - D. Повышение трансфераз
408. ИСТОЧНИКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРАГРИППОМ ЯВЛЯЕТСЯ:
- A. предметы обихода со слюной больного
 - B. кровь больного
 - C. воздух комнаты, где находился больной
 - D. больной
409. ВЕДУЩИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ЭПЭ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ
- A. загрязненные предметы обихода
 - B. зараженные вши
 - C. фрукты
 - D. вода
410. ВЕДУЩИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ЭТЭ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ:
- A. воздух комнаты, где находился больной
 - B. кровь больного
 - C. купание в загрязненных водоемах
 - D. укусы насекомых
411. ВЕДУЩИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ:
- A. грызуны
 - A. инфицированные пищевые продукты
 - B. предметы обихода
 - C. вода
412. ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ЭГЭ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
- A. клещи
 - B. мясные продукты
 - C. уход за больным животным (скотом)
 - D. гамбургеры
413. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- A. вакцинация и специфический иммуноглобулин
- B. кесарево сечение
- C. химиопрофилактика
- D. воздержание от грудного вскармливания

414. ПРИ ВВЕДЕНИИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ОРГАНИЗМЕ РАЗВИВАЕТСЯ

- A. естественный активный иммунитет сроком до года
- B. искусственный активный иммунитет до 1.5 мес
- C. естественный пассивный иммунитет сроком до 6 мес
- D. искусственный пассивный иммунитет сроком до 3 мес

415. ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА КОРЬЮ В ОРГАНИЗМЕ РАЗВИВАЕТСЯ:

- E. естественный активный иммунитет
- A. искусственный активный иммунитет
- B. естественный пассивный иммунитет
- C. искусственный пассивный иммунитет

416. АЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ БЕСКЛЕТОЧНОЙ ВАКЦИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. БЦЖ
- B. Энджерикс
- C. Инфанрикс
- D. Тетракокк

417. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ:

- A. отсутствие цикличности течения
- B. наличие возбудителя
- C. формирование иммунитета после перенесенного заболевания
- D. контагиозность

418. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ НАЗЫВАЮТ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ

- A. возбудителем данного заболевания и являющиеся следствием необычной выраженности клинических проявлений и морфофункциональных изменений
- B. микроорганизмами другого вида
- C. тем же возбудителем возникающее на первой неделе заболевания
- D. тем же возбудителем возникающее на поздних сроках заболевания

419. К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕ ОТНОСИТСЯ

- A. молекулярно-генетический метод
- B. вирусологический
- C. бактериологический
- D. инструментальный метод

420. К ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРОТЕРАПИИ НЕ ОТНОСИТСЯ

- A. анафилактический шок
- B. феномен Артюса
- C. сывороточная болезнь
- D. септический шок

421. К АНТИБИОТИКАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- A. фторхинолоны

- В. цефалоспорины
- С. аминогликозиды
- Д. пребиотики

422. К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕ ОТНОСЯТ

- А. антибактериальную , патогенетическую , симптоматическую терапию
- В. этиотропную терапию, патогенетическую терапию, симптоматическую терапию
- С. противовирусную , патогенетическую , симптоматическую терапию
- Д. серотерапию, вакцинотерапию, диуретическую терапию

423. ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ И МУТАГЕННОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А. вирус гепатита С
- В. риновирус
- С. реовирус
- Д. аденовирус

424. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ПАРАГРИППА

- А. контактный
- В. трансмиссивный
- С. воздушно-капельный
- Д. вертикальный

425. ПОРАЖЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПАРАГРИППЕ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО НА УРОВНЕ

- А. носа и его придаточных пазух
- В. гортани
- С. трахеи
- Д. альвеол легких

426. ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПРИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. ринит, фарингоконъюнктивит
- В. трахеит, колит
- С. ларингит, стеноз гортани
- Д. тонзиллит, ангина

427. ПЕРВИЧНЫЙ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ПРОТЕКАЕТ

- А. в виде ОРВИ
- В. бессимптомно
- С. в виде экземы Капоши
- Д. в виде генерализованной инфекции

428. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОРАЖЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 2-ГО ТИПА

- А. слизистая оболочка половых органов
- В. губы
- С. кожа туловища
- Д. кожа волосистой части головы

429. ТИПИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЫПИ ПРИ ПРОСТОМ ГЕРПЕСЕ

- А. папула
- В. везикула

- C. розеола
- D. петехия

430. ПЕРСИСТЕНЦИЯ ЦИОМЕГАЛОВИРУСА В ОРГАНИЗМЕ ХАРАКТЕРНА В

- A. слюнных железах
- B. эпителии почек
- C. эпителии легких
- D. правильно все вышеперечисленное

431. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ВЭБ ЭТИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТА

- A. атипичных мононуклеаров более 15%
- B. ретикулоцитов 15%-20%
- C. акантоцитов 15-50%
- D. миелоцитов 5-10%

432. ПРИПУХЛОСТЬ В СУБМАНДИБУЛЯРНОЙ И СУБЛИНГВАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ В СОЧЕТАНИИ С КРАТКОВРЕМЕННЫМ СУБФЕБРИЛКЕТАТОМ И ПАНКРИАТИТОМ ЯВЛЯЮТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ

- A. аденовирусной инфекции
- B. инфекционного мононуклеоза
- C. токсокароза
- D. эпидемического паротита

433. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА В ОЧАГЕ ПРОВОДИТСЯ

- A. в первые 10 дней
- B. в первые 96 часов
- C. в первые 7 дней
- D. не проводится

434. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В ЯВЛЯЕТСЯ

- A. человек с острой формой заболевания
- B. носитель
- C. человек, больной хронической формой заболевания
- D. все перечисленное

435. МАРКЕРОМ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ПРИ ГЕПАТИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. повышение уровня ФМФА и АЛТ
- B. повышение уровня СРБ и сиаловых кислот
- C. повышение уровня ЩФ и ГГТП
- D. повышение уровня креатинина

436. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. тяжесть течения
- B. большая частота неблагоприятных исходов (выкидыши)
- C. возможность летального исхода
- D. все выше перечисленное

437. В ЖЕЛТУШНОМ ПЕРИОДЕ вирусного гепатита А характеризуется

- A. фебрильной лихорадкой
- B. выраженной интоксикацией

- C. отсутствием желтухи
- D. улучшение самочувствия

438. В 25% СЛУЧАЕВ ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С ПРОТЕКАЕТ В ФОРМЕ

- A. субклинической или безжелтушной
- B. желтушной
- C. тяжелой с гипербилирубинемией
- D. цирроза печени

439. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- A. HВсogAB
- B. HDV AB
- C. HAV AB
- D. HCV AB

440. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. постельные принадлежности
- B. домашние животные
- C. загрязненная вода
- D. больной человек

441. ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

- A. трансплацентарный
- B. половой
- C. парентеральный
- D. все выше перечисленные

442. МИНИСТР МЗ РФ НАЗНАЧАЕТСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ:

- A. главными специалистами
- B. президентом РФ
- C. советниками президента
- D. всеми выше перечисленные

443. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН И ЕГО ДИАГНОЗЕ. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ЕГО МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ. СОСТАВЛЯЮТ:

- A. катамнез
- B. анамнез
- C. врачебную тайну
- D. личное дело

444. В РФ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

- A. ведомственную и вневедомственную
- B. государственную, муниципальную и частную
- C. только государственную и муниципальную
- D. городскую и сельскую

445. ОСНОВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗОЙ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ШИРОКИЙ КРУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- B. Концепция развития здравоохранения до 2020 года

- С. ФЗ РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации
- Д. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

446. ПРИ РАСЧЕТЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

- А. число всех имевшихся у населения заболеваний, как впервые выявленных в данном году, так и зарегистрированных ранее, по поводу которых больной вновь обратился в этом году
- В. число заболеваний выявленных на профилактических осмотрах
- С. число новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном году выявленных заболеваний
- Д. число заболеваний выявленных по данным о причинах смерти

447. ПРОВЕДЕН СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ВСЕХ ПОДРОСТКОВ, РОДИВШИХ В СПБ В МАРТЕ 20.. ГОДА. КАКОЙ МЕТОД МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН:

- А. многоступенчатого отбора
- В. сплошной
- С. серийной выборки
- Д. когортный метод

448. МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОКАЗАНИЕ:

- А. профилактической помощи
- В. лечебно-диагностической
- С. санаторно-курортного лечения
- Д. все выше перечисленное

449. МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- А. сравнения интенсивных показателей, рассчитанных в различной среде
- В. выявления и измерения связи между явлениями
- С. оценки величины изменения явления на протяжении определенного промежутка времени
- Д. предоставление обобщенной характеристики трех и более средних величин или показателей

450. ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. карта диспансерного наблюдения
- В. карта профилактических прививок
- С. амбулаторная карта
- Д. все выше перечисленное

451. ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А. преемственность в работе врачей
- В. диспансерное наблюдение
- С. этапность в лечении
- Д. принцип участковости

452. В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАНОСА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТАЦИОНАР ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ:

- A. наличие боксированного приемного покоя
- B. учет сведений о контактах с инфекционными больными
- C. проведение регулярных медицинских осмотров персонала
- D. все перечисленное верно

453. ПО ПРОФИЛЮ БОЛЬНИЦЫ ДЕЛЯТСЯ НА:

- A. многопрофильные
- B. стационары диспансеров
- C. специализированные
- D. все перечисленное верно

454. В РФ БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЪЕМЕ:

- A. только первичная медико-санитарная
- B. только экстренная
- C. в рамках «Программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи»
- D. только стационарная

455. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ ДЕЛЯТСЯ НА:

- A. областные (краевые, республиканские)
- B. районные
- C. городские
- D. все перечисленное верно

456. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – ЭТО:

- A. комплекс медицинских мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний
- B. комплекс санитарно-гигиенических и психологических мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений профилактики:
- C. комплекс социальных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний
- D. все перечисленное верно

457. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ – ЭТО:

- A. система группировки болезней и патологических состояний
- B. перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний
- C. перечень диагнозов
- D. все перечисленное верно

458. К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ОТНОСЯТСЯ:

В зависимости от административно-территориального положения больницы делятся на:

- A. целевые
- B. периодические
- C. скрининг осмотры
- D. все перечисленное верно

459. ОСНОВНЫМ УЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТОМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. медицинская карта амбулаторного больного
- B. контрольная карта диспансерного наблюдения

- C. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом остром, профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
- D. карта эпидемиологического обследования

460. В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СТОЯТ БОЛЕЗНИ:

- A. системы кровообращения
- B. желудочно-кишечного тракта
- C. органов дыхания
- D. нервной системы

461. НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЛИЯЮТ:

- A. социально-экономические факторы
- B. социально-биологические факторы
- C. медицинские факторы
- D. все перечисленное верно
областные (краевые, республиканские)

462. НЕАРГУМЕНТИРОВАННОЕ СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОТРУДНИКА ИЛИ ГРУППУ ЛЮДЕЙ С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ - ЭТО

- A. убеждение
- B. заражение
- C. инфицирование
- D. внушение

463. К БАРЬЕРАМ КОММУНИКАЦИИ НЕ ОТНОСЯТ:

- A. корректная обратная связь и взаимодействие в коллективе
- B. незнание языка собеседника
- C. отрицательный эмоциональный настрой
- D. некорректная обратная связь

464. ЭФФЕКТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ЭФФЕКТ ВОСПРИЯТИЯ – ЭТО:

- A. стремление произвести наилучшее впечатление о своей работоспособности
- B. тенденция к привлечению внимания к себе
- C. тенденция к переоценке качеств внешне привлекательного человека
- D. стремление занять лидирующие позиции

465. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. выявление методов эффективного взаимодействия с пациентами и их родственниками
- B. популяризация здорового образа жизни
- C. формирование мотивации у пациента самосохранительного и здоровьесберегающего поведения
- D. формирование мотивации пациентов на повышение материальных затрат на медицинские услуги

466. СУБЪЕКТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. здоровые люди
- B. пациенты с установленными диагнозами
- C. родственники
- D. пациенты, проходящие диагностическое обследование

467. К ЭМПИРИЧЕСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) МЕТОДАМ МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- A. эксперимент, моделирование, рейтинг, тестирование
- B. наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент
- C. осмотр, анализ, сбор анамнеза, обследование
- D. беседа, классификация, синтез, шкалирование

468. МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА: АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ (НАПРИМЕР, ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ И Т.Д.) НАЗЫВАЮТСЯ:

- A. имитационными
- B. наглядными
- C. словестными
- D. неимитационными

469. СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ, В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ПРИ КОТОРОМ ЗАВЕДУЮЩИЙ ЕДИНОЛИЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СУБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГОГО ВРАЧА, НАЗЫВАЕТСЯ:

- A. игнорирующим
- B. авторитарным
- C. демократическим
- D. унижающим

470. ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПОЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. конфликт
- B. теоретический анализ
- C. эмпатия
- D. обмен знаниями

471. ПРИ КАКОМ ТИПЕ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ХАРАКТЕРНО ЖЕЛАНИЕ СКРЫТЬ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ:

- A. анозогнозический
- B. тревожный
- C. сенситивный
- D. неврастенический

472. УМЕНИЕ ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА ДОСТУПНО ИЗЛАГАТЬ МАТЕРИАЛ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ И ДР. ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ К _____ УМЕНИЯМ.

- A. рефлексивным
- B. информационно-дидактическим
- C. организационным
- D. коммуникативным

473. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- A. средствами обучения

- В. потребностями и возможностями общества
- С. мастерством педагога
- Д. индивидуальными особенностями учащегося

474. ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УРОВНЕМ

- А. подготовки педагогов
- В. развития технологий обучения
- С. требований родителей
- Д. социальных и научных достижений

475. ЕДИНСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЦЕСС, ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕГО.

- А. целенаправленность
- В. индивидуальность
- С. управляемость
- Д. целостность

476. ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОЧАГА ЭТО

- А. организм неинфицированного человека
- В. местность с источником инфекции, в пределах которой возможно заражение других людей
- С. предметы внешней среды, на которых возбудитель сохраняется
- Д. предметы внешней среды, на которых возбудитель размножается

477. ПРОЦЕДУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ВОСПРИИМЧИВЫХ ЛИЦ, ЭТО

- А. иммунопрофилактика
- В. отстранение от работы больных из числа лиц эпидемиологически значимых профессий
- С. дезинсекция
- Д. наблюдение в за контактными в очаге

478. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЫЯВЛЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ЛИЦ СЕРОНЕГАТИВНЫХ К КРАСНУШНОМУ ДИАГНОСТИКУМУ, НО СЕРОПОЗИТИВНЫХ К КОКЛЮШНОМУ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- А. невыявленного эпидемического процесса коклюша
- В. удовлетворительной работы прививочного кабинета
- С. недостаточной иммунопрофилактики
- Д. отсутствия эпидемического процесса краснухи

479. ЕСЛИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БОЛЕЕ 90 % СЕРОПОЗИТИВНЫХ ЛИЦ К КРАСНУШНОМУ И КОКЛЮШНОМУ ДИАГНОСТИКУМАМ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ

- А. отсутствием вакцинопрофилактики
- В. невыявленного эпидемического процесса коклюша
- С. хорошей работы прививочной службы
- Д. отсутствия эпидемического процесса коклюша

480. ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. укус известного животного
- В. укус домашней собаки
- С. укус хорька
- Д. царапины, нанесенные домашней кошкой

481. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В:
- A. HBsAg
 - B. убитый вирус
 - C. активный вирус
 - D. HBeAb
482. ЧТО ПОЯВЛЯЕТСЯ В КРОВИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В
- A. HCV Ag
 - B. HBs Ab
 - C. HDV IgM
 - D. Снижение трансаминаз
483. ПРИ ГРИППЕ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:
- A. слюна больного
 - B. больной человек
 - C. комната где находился больной
 - D. желудочно – кишечное отделяемое больного
484. ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СЫПНОГО ТИФА
- A. мухи зараженные сыпным тифом
 - B. больной человек
 - C. носовой платок больного
 - D. отделяемое из носоглотки больного
485. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ БЕШЕНСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:
- A. дезинсекция
 - B. промывание раны, нанесенной зараженным животным
 - C. вакцинопрофилактика
 - D. препараты иммуноглобулина
486. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА
- A. вакцина входит в Национальный календарь профилактических прививок, прививаются все согласно возрасту
 - B. вакцина вводится по эпидемическим показаниям
 - C. вакцина проводится после контакта с больным эпидемическим паротитом
 - D. вакцинация не проводится
487. ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А ЯВЛЯЕТСЯ
- A. дикие животные
 - B. грызуны
 - C. человек, больной острой и хронической формой заболевания
 - D. нет правильного ответа
488. СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- A. увеличение уровня АлАТ
 - B. нейтрофиллезом
 - C. повышение СОЭ
 - D. снижение уровня мочевины

489. ЧТО ОТЛИЧАЕТ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ Е ОТ ОСТАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

- A. чаще переходит в хронические стадии
- B. парентеральный механизм передачи
- C. чаще формируются неблагоприятных исходы у беременных женщин
- D. склонен к эпидемическому распространению в странах с холодным климатом

490. ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А С ПОЯВЛЕНИЕМ ЖЕЛТУХИ САМОЧУВСТВИЕ БОЛЬНОГО

- A. значительно улучшается
- B. ухудшается
- C. остается без изменений
- D. становится критичным

491. ОСНОВНОЙ МАРКЕР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

- A. HBeAg
- B. HBsAg
- C. HAV AB
- D. HEV AB

492. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

- A. домашние животные
- B. грызуны
- C. больной в любой фазе заболевания
- D. помещение где находился больной человек

493. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

- A. половой
- B. пищевой
- C. вертикальный
- D. парентеральный

494. НА КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ИЗОЛИРУЮТ БОЛЬНОГО ПРИОБРЕТЕННОЙ КРАСНУХОЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЭЛЕМЕНТА СЫПИ

- A. 14
- B. 7
- C. 5
- D. 10

495. НА КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОДЛЕЖИТ ИЗОЛЯЦИИ БОЛЬНОЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЭЛЕМЕНТА СЫПИ

- A. 3
- B. 7
- C. 5
- D. 9

496. С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО БОЛЬНОГО И ДО _____ ДНЯ С МОМЕНТА ИЗОЛЯЦИИ ПОСЛЕДНЕГО ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ, НЕ БОЛЕВШИЕ КОРЬЮ, КРАСНУХОЙ И ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРОТИТОМ И НЕ ПРИВИТЫЕ ПРОТИВ ЭТИХ ИНФЕКЦИЙ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ В ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- A. 21 день
- B. 14 дней
- C. 11 дней
- D. 7 дней

497. НА КАКОЙ СРОК ПОДЛЕЖАТ ИЗОЛЯЦИИ КОНТАКТНЫЕ ПО СКАРЛАТИНЕ ДОШКОЛЬНИКИ И ШКОЛЬНИКИ 1-2 КЛАССА

- A. 7 дней
- B. 15 дней
- C. 21 день
- D. 14 дней

498. НА КАКОЙ СРОК ПРОИЗВОДЯТ ИЗОЛЯЦИЮ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ

- A. 25 дней
- B. 14 дней
- C. 3 дня
- D. 21 день

499. СРОК ИЗОЛЯЦИИ КОНТАКТНЫХ ПО КОКЛЮШУ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, РАБОТАЮЩИХ В ДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПОВ

- A. 21 день
- B. 14 дней
- C. 5 дней
- D. 10 дней

500. НА КАКОЙ СРОК ИЗОЛИРУЮТ ЛИЦ КОНТАКТНЫХ С ЧУМОЙ

- A. 15 дней
- B. 21 день
- C. 7 дней
- D. 5 дней

501. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ:

- A. судорог
- B. Однократной рвоты
- C. Субфебрильной температуры тела
- D. частого влажного кашля

502. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ГРИППА У ДЕТЕЙ

- A. все выше перечисленное
- B. ожирение
- C. гипотрофия, иммунодефицитное состояние
- D. недоношенность, анемия

503. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ДИЗЕНТЕРИИ ЗОННЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- A. овощи
- B. животные
- C. вещи личной гигиены
- D. молоко и молочные продукты

504. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ЧУМЕ

- A. комары
- B. клещи
- C. блохи
- D. слепни

505. САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. введение антирабической сыворотки
- B. естественные роды
- C. химиопрофилактика
- D. отказ от грудного вскармливания

506. ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В У НОВОРОЖДЕННЫХ

- A. кесарево сечение
- B. вакцинация
- C. химиопрофилактика
- D. отказ от грудного вскармливания

507. КАКОЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ИММУННЫХ СЫВОРОТОК И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ

- A. искусственный пассивный иммунитет
- B. естественный активный иммунитет
- C. искусственный активный иммунитет
- D. естественный пассивный иммунитет

508. КАКОЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН:

- A. естественный активный иммунитет
- B. естественный пассивный иммунитет
- C. искусственный активный иммунитет
- D. искусственный пассивный иммунитет

509. К КАКОЙ ВАКЦИНЕ ОТНОСИТСЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В

- A. рекомбинантные
- B. живые
- C. анатоксины
- D. комплексные

510. В 80 – 90% СЛУЧАЕВ ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С ПРОТЕКАЕТ В ФОРМЕ

- A. тяжелой
- B. безжелтушной
- C. субклинической или безжелтушной
- D. цирроз печени

511. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ?

- A. Система медицинских мероприятий, направленных на реабилитацию.
- B. Система медицинских мероприятий, направленных на выявление заболеваний.
- C. Система медицинских мероприятий, направленных на выявление заболеваний или факторов, влияющих на их возникновение, для оценки состояния здоровья каждого гражданина.
- D. все ответы неверны

512. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, КАК СИСТЕМА МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ:

- A. Диспансерный осмотр.
- B. Диспансерное динамическое наблюдение за состоянием здоровья.
- C. Пропаганду здорового образа жизни.
- D. Всё перечисленное.

513. КТО ИЗ ГРАЖДАН ИМЕЕТ ПРАВО НА ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА?

- A. Работающие граждане.
- B. Пенсионеры.
- C. Дети
- D. Все выше перечисленные

514. КАКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ?

- A. Поликлиника.
- B. Диспансер.
- C. Стационар.
- D. Центр гигиены и эпидемиологии.

515. ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ НА ПАЦИЕНТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ:

- A. Медицинская карта амбулаторного больного (форма 25/у).
- B. Индивидуальная программа реабилитации.
- C. Направление на МРЭК.
- D. Карта учёта диспансерного наблюдения (форма 131/у-Д).

516. ДИСПАНСЕРНЫЙ ОСМОТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО:

- A. Индивидуальной необходимости.
- B. Желанию обследуемого пациента.
- C. В объёме определённом для каждой возрастной группы.
- D. желанию родственников пациента

517. КУДА ЗАНОСЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА?

- A. В справку о состоянии здоровья.
- B. Медицинскую карту амбулаторного больного (форма 25/у).
- C. Выписку из медицинских документов.
- D. Карту учёта диспансерного наблюдения (форма 131/у-Д).

518. ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИКЛИНИКУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА:

- A. Только по направлению от участкового терапевта.
- B. Только по направлению главного врача.
- C. Только по направлению из предприятия.
- D. Самостоятельно.

519. КТО ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?

- A. Учителя.
- B. Дети.
- C. Работающие.
- D. Все выше перечисленные контингенты

520. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ БЫВАЮТ:

- A. целевые
- B. скрининговые.
- C. периодические.
- D. все выше перечисленные

521. ДЛЯ ЧЕГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ГРАЖДАНИНА К ГРУППЕ ДИСПАНСЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ?

- A. Для планирования проведения необходимых медицинских мероприятий.
- B. Для трудоустройства.
- C. Для поступления в ВУЗ.
- D. Для занятия в спортивных секциях.

522. СКОЛЬКО ГРУПП ДИСПАНСЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 5

523. К ГРУППЕ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЁТА Д (I) ОТНОСЯТСЯ:

- A. Здоровые граждане, не предъявляющие жалоб, у которых в анамнезе или во время осмотра не выявлены острые и хронические заболевания.
- B. Здоровые граждане, имеющие в анамнезе острые заболевания или факторы риска хронических заболеваний.
- C. Граждане, имеющие хронические заболевания, с периодическими обострениями и снижением трудоспособности.
- D. Граждане, имеющие хронические заболевания, без периодических обострений и снижения трудоспособности.

524. К ГРУППЕ ДИСПАНСЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ Д (II) ОТНОСЯТСЯ:

- A. Здоровые граждане, не предъявляющие жалоб, у которых в анамнезе или во время осмотра не выявлены острые и хронические заболевания.
- B. Здоровые граждане, имеющие в анамнезе острые заболевания или факторы риска хронических заболеваний.
- C. Граждане, имеющие хронические заболевания, с периодическими обострениями и снижением трудоспособности.
- D. Граждане, имеющие хронические заболевания, без периодических обострений и снижения трудоспособности.

525. К ГРУППЕ ДИСПАНСЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ Д (III) ОТНОСЯТСЯ:

- A. Здоровые граждане, не предъявляющие жалоб, у которых в анамнезе или во время осмотра не выявлены острые и хронические заболевания.
- B. Здоровые граждане, имеющие в анамнезе острые заболевания или факторы риска хронических заболеваний.
- C. Граждане, имеющие хронические заболевания, с периодическими обострениями и снижением трудоспособности.
- D. Граждане, имеющие хронические заболевания, без периодических обострений и снижения трудоспособности.

526. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРУППЫ ДИСПАНСЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЕСЛИ ИХ ДАВНОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ:

- A. 10 дней.
- B. 1 месяца.
- C. 3 месяцев.
- D. 1 года.

527. ДЛЯ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ В ГРУППЕ ДИСПАНСЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ Д (II), ВРАЧОМ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ:

- A. Справка о состоянии здоровья.
- B. Выписка из медицинских документов.
- C. Индивидуальная программа профилактики факторов риска развития заболеваний.
- D. Лист временной нетрудоспособности.

528. КОНТРОЛЬ НАД ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

- A. Министерством Здравоохранения.
- B. Управлением здравоохранения облисполкомов..
- C. Главными врачами.
- D. Заместителями главного врача по медицинской части.
- E. Заведующими отделения.

529. ОБЪЁМ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИИ ЛИЦ 18-29 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ:

- A. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины).
- B. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины), ЭКГ.
- C. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины), ЭКГ, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице SCORE, измерение внутриглазного давления.
- D. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины), ЭКГ, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице SCORE, измерение внутриглазного давления, исследование предстательной железы (мужчины).

530. ОБЪЁМ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИИ ЛИЦ 30-39 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ:

- A. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины).
- B. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины), ЭКГ.
- C. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины), ЭКГ, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице SCORE, измерение внутриглазного давления.
- D. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гинеколога и молочных желез (женщины), ЭКГ, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице SCORE, измерение внутриглазного давления, исследование предстательной железы (мужчины).

531. ОБЪЁМ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИИ ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ:

- А. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гениколога и молочных желез (женщины).
- В. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гениколога и молочных желез (женщины), ЭКГ.
- С. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гениколога и молочных желез (женщины), ЭКГ, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице SCORE, измерение внутриглазного давления.
- Д. АД, ИМТ, ОАК, ОАМ, глюкоза и холестерин крови (по показаниям), флюорография, осмотр врача-гениколога и молочных желез (женщины), ЭКГ, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице SCORE, измерение внутриглазного давления, исследование предстательной железы (мужчины).

532. ПАЦИЕНТЫ С ЦМВИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ В ПОЛИКЛИНИКЕ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА:

- А. Наблюдаются у главного врача.
- В. Наблюдаются у заведующего терапевтическим отделением
- С. Наблюдаются у участкового педиатра.
- Д. Остаются без диспансерного динамического наблюдения.

533. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПО Д (I):

- А. Отсутствие развития заболевания, уменьшение факторов риска.
- В. Улучшение состояния, снижение дней временной нетрудоспособности.
- С. Всё перечисленное.
- Д. Ничего из перечисленного.

534. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ:

- А. Отсутствие обострений.
- В. Снижение временной нетрудоспособности.
- С. Уменьшение факторов риска.
- Д. Всё перечисленное.

535. СРОКИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ КОКЛЮШЕ ВРАЧОМ - ИНФЕКЦИОНИСТОМ:

- А. Наблюдается до достижения критериев эффективности.
- В. Наблюдается пожизненно.
- С. Не наблюдается.
- Д. 12 месяцев

536. В ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВХОДИТ:

- А. Определение группы диспансерного динамического наблюдения.
- В. Составление карты учёта диспансерного наблюдения (форма 131/у-Д).
- С. Работа по формированию и пропаганде ЗОЖ.
- Д. Всё перечисленное.

537. МЕРОПРИЯТИЯ У ПАЦИЕНТА после перенесенного менингита СВОДЯТСЯ К:

- А. режим дня.
- В. наблюдение врачом - неврологом.
- С. Наблюдение врачом - инфекционистом.
- Д. Всё перечисленное.

538. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТА ДИЗЕНТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ:
- A. Врачом-инфекционистом.
 - B. Врачом-педиатром.
 - C. Врачом-аллергологом.
 - D. все перечисленные.
539. ВСЕ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЫ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ:
- A. 1 месяца
 - B. 1 года
 - C. 6 месяцев
 - D. не находятся под диспансерным наблюдением
540. РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЫ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС НАБЛЮДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
- A. неврологом, инфекционистом
 - B. урологом
 - C. Только инфекционистом
 - D. участковым педиатром
541. ДЕТИ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ СКАРЛАТИНОЙ В ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМАХ ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ:
- A. 1 года
 - B. 1 месяца
 - C. 5 месяцев
 - D. Не Подлежат Диспансеризации
542. РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЫ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА НАХОДЯТСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ
- A. 12 месяцев
 - B. 1 месяца
 - C. 3 месяцев
 - D. под наблюдением находятся только переболевшие тяжелыми формами с осложнениями.
543. КТО ЗАНИМАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ ВСЕХ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ВГА
- A. Участковый педиатр
 - B. Гепатолог
 - C. Врач – инфекционист/ врач - педиатр
 - D. не наблюдаются
544. ШКОЛЬНИКИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ШИГЕЛЛЕЗА НАБЛЮДАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ:
- A. 1 месяца
 - B. 1 года
 - C. 21 дня
 - D. не находятся под диспансерным наблюдением
545. РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ПОСЕЩАЮЩИЕ МЛАДШУЮ ГРУППУ ДЕТСКОГО САДА, НАБЛЮДАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ
- A. 1 года

- В. 3 месяцев
- С. 6 месяцев
- Д. не наблюдаются

546. ПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ ПРОТИВОКЛЕЩЕВОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- Е. укус необследованного клеща
- Ф. укус инфицированного клеща
- Г. укус неизвестного животного
- Н. ослонение и царапины, нанесенные бездомной собакой

547. ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ВОЗВРАТНОМ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ТИФЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ

- Е. платяные вши
- Ф. блохи
- Г. клещи
- Н. слепни

548. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА В ОТ МАТЕРИ К ПЛОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- Е. кесарево сечение
- Ф. введение иммуноглобулинов
- Г. химиопрофилактика
- Н. воздержание от грудного вскармливания

549. СПЕЦИИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ДЕТЯМ ИЗ ГРУПП РИСКА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- Е. 0-1-6
- Ф. 0-3-6
- Г. 0-3-6-12
- Н. 0-1-2-12

550. РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЫ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА ВЫПИСЫВАЮТСЯ НЕ РАНЕЕ _____ ДНЯ БОЛЕЗНИ ПРИ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ОСТРЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И НОРМАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Е. 14
- Ф. 17
- Г. 21
- Н. 22

551. ИСТОЧНИКОМ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- Е. больной человек
- Ф. домашние животные
- Г. бактерионоситель
- Н. вода

552. ВЗРОСЛЫЕ, НЕ БОЛЕВШИЕ КРАСНУХОЙ, НЕ ПРИВИТЫЕ ПРОТИВ КРАСНУХИ, ПРИВИТЫЕ ОДНОКРАТНО, НЕ ИМЕЮЩИЕ СВЕДЕНИЙ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КРАСНУХИ ПОДЛЕЖАТ

- Е. все взрослые подлежат вакцинации
- Ф. не подлежат вакцинации
- Г. женщины до 35 лет подлежат вакцинации

Н. женщины до 25 лет подлежат вакцинации

553. КОНТАКТНЫЕ ПО КРАСНУХЕ ДОШКОЛЬНИКИ И ШКОЛЬНИКИ 1-2 КЛАССА ПОДЛЕЖАТ ИЗОЛЯЦИИ НА _____ ДНЕЙ

Е. 11

Ф. 21

Г. не подлежат изоляции

Н. нет правильных вариантов

554. БОЛЬНЫХ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ДЕТЕЙ ИЗОЛИРУЮТ НА _____ ДНЕЙ

Е. 10

Ф. 11

Г. 21

Н. 25

555. КОНТАКТНЫЕ ПО ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ДЕТИ ПОДЛЕЖАТ КАРАНТИНУ НА _____ ДНЕЙ

Е. 10

Ф. 11

Г. 21

Н. 25

556. ВОЗБУДИТЕЛЕМ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

Е. *J. pestis*

Ф. *B. anthracis*

Г. *B. melitensis*

Н. *B. abortus bovis*

557. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ СКАРЛАТИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. клинический анализ крови, общий анализ мочи

Ф. клинический анализ крови, общий анализ мочи, иммунограмму

Г. клинический анализ крови, общий анализ мочи, определение в материале из ротоглотки и носа БГСА однократно

Н. клинический анализ крови, общий анализ мочи, определение в материале из ротоглотки и носа БГСА двукратно

558. ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ КОРИ В РАННИЕ СРОКИ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

Е. наличие пятнисто-папулезной сыпи

Ф. пятна Бельского-Филатова-Коплика

Г. энантема на мягком небе

Н. характерный катаральный синдром

559. СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ИСКЛЮЧАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

Е. антибактериальных препаратов из группы пенициллинов

Ф. антибактериальных препаратов из группы цефалоспоринов

Г. любых антибактериальных препаратов

Н. глюкокортикоидов

560. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ПРИ БОТУЛИЗМЕ:

- A) контактно-бытовой
- B) пищевой
- C) водный
- D) воздушно-капельный
- E) парентеральный

561. ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ:

- A) больные люди
- B) здоровые люди
- C) больные животные
- D) больные люди, животные

562. ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ:

- A) парентеральный
- B) вертикальный
- C) алиментарно-пищевой
- D) трансмиссивный

563. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА:

- A) ОАК
- B) ОАМ
- C) б/х анализ крови
- D) бактериологические анализы

564. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИЧ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ ВИЧ ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ:\

- A) ИФА
- B) Иммуноблотинг
- C) ПЦР
- D) ОАК с развернутой лейкоформулой

565. НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ОБРАТИЛСЯ БОЛЬНОЙ ПО ПОВОДУ ОСТРО РАЗВИВШЕЙСЯ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ, КОТОРАЯ ВОЗНИКЛА НА ФОНЕ ПОВТОРНОЙ РВОТЫ. ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНЫ ДВУХСТОРОННИЙ ПТОЗ ВЕК, МИДРИАЗ, СУХОСТЬ СЛИЗИСТЫХ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ.

- A) отравление беладонной
- B) клещевой энцефалит
- C) ботулизм
- D) отравление метиловым спиртом

566. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА БОТУЛИЗМ:

- A) сухость слизистых
- B) тошнота, ощущение тяжести в эпигастрии
- C) дискомфорт в животе, диарея
- D) бульбарные расстройства (нарушение зрения, глотания и т.д)

567. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ХОЛЕРЫ:

- A) ОАК, ОАМ, ОАК
- B) бактериологический

- С) серологический
- Д) кожно-аллергическая проба

568. СТУЛ ПРИ АМЕБИАЗЕ ИМЕЕТ ВИД:

- А) горохового супа
- В) рисового отвара
- С) малинового желе
- Д) водянистый, пенистый

569. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПТИ:

- А) ОАК, ОАМ, ОАК
- В) бактериологическая
- С) серологическая
- Д) кожно-аллергическая

570. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ:

- А) клинические анализы
- В) бактериологические анализы
- С) кожно-аллергические пробы
- Д) R-графия

571. ХАРАКТЕР СТУЛА ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ:

- А) вид рисового отвара
- В) вид горохового стула
- С) малиновое желе
- Д) слизь, кровь « ректальный плевок»

572. Лабораторная диагностика при дизентерии:

- А) ОАК, ОАМ, ОАК
- В) бактериологические анализы кала
- С) копрологические анализы
- Д) бактериологические анализы крови

573. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:

- А) встречный иммуно-электрофорез
- В) иммуноблотинг
- С) РСК
- Д) РПГА

574. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ МЕТОДОМ ИФА:

- А) изолировать больного
- В) предупредить его об уголовной ответственности в случае распространения заболевания
- С) информировать родственников
- Д) повторить исследование крови методом ИФА с другой тест-системой

575. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДИАГНОЗА ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В РЕАКЦИИ ИММУНОБЛОТИНГА:

- А) информировать больного о заболевании
- В) информировать родственников
- С) изолировать больного
- Д) сделать повторный анализ

576.ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ СТУЛ БЫВАЕТ :

- A) в виде «ректального плевка »
- B) зловонный зеленый
- C) ахоличный
- D) в виде рисового отвара

577.ПРИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ (ГЕМОКУЛЬТУРА) КРОВЬ БЕРЕТСЯ:

- A) из пальца
- B) сыворотка крови
- C) толстая капля крови
- D) из вены

578.СИМПТОМ ГОВОРОВА-ГОДЕЛЬЕ ХАРАКТЕРЕН:

- A) Менингита
- B) Ботулизма
- C) Туляремия
- D) Сыпного тифа

579.В КАКИХ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ВИЧ СОДЕРЖИТСЯ В НАИБОЛЬШИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ:

- A) Кровь
- B) Слюна
- C) Женское молоко
- D) Моча

580.НА КАКОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АНТИТЕЛ ИЗ КРОВИ:

- A) В стадии лимфаденопатии
- B) Терминальная стадия СПИД
- C) В стадии СПИД ассоциированного комплекса
- D) Исчезновение антител не происходит

581.НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТАВИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ:

- A) повышения Alat,Asat
- B)обнаружения маркеров вирусных гепатитов
- C) повышения уровня билирубина
- D) снижения холестерина

582.ВЕДУЩИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

- A)Бактериологический
- B) Бактериоскопический
- C)Биологический
- D)Серологический

583.ВЕДУЩИЙ МЕТОД ТЕРАПИИ БОТУЛИЗМА:

- A) антибактериальная специфическая
- B) антибактериальная неспецифическая
- C) антитоксическая специфическая
- D) антитоксическая неспецифическая

584. ТИПИЧНЫЙ ОЧАГ РАЗМНОЖЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ДИЗЕНТЕРИИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА:

- A) лимфатические образования тонкого кишечника
- B) слизистая оболочка толстого кишечника
- C) паренхиматозные органы
- D) кровь

585. ХОЛЕРНЫЙ ВИБРИОН ВЫЗЫВАЕТ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ:

- A) истинное воспаление
- B) нарушение водно-солевого баланса
- C) нарушение гормонального обмена
- D) нарушение пигментного обмена

586. В ТЕРАПИИ ЭТЭ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НЕ ПОКАЗАН

- A. спазмолитические препараты
- B. лоперамид
- C. пробиотик
- D. энтеросорбенты

587. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА ПРИ ПОЛИОМИЕЛИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- A. фебрильной лихорадки
- B. положительных менингеальных симптомов
- C. нарастающая головная боль в лобно-височных областях
- D. все выше перечисленное

588. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ КОРЬ ОТ КРАСНУХИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- A. пятна Бельского-Филатова-Коплика
- B. пятнисто-папулезная сыпь
- C. катаральный синдром
- D. сыпь на неизменном фоне кожи

589. ПОРАЖЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РС-ИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО НА УРОВНЕ

- A. носа и его придаточных пазух
- B. гортани
- C. трахеи
- D. бронхиол

590. ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АНТИБИОТИК

- A. амикацин
- B. левомицетин
- C. цефтриаксон
- D. ципрофлоксацин

591. ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- A. воздействие отравляющих веществ
- B. воздействие экзотоксинов при инфекционной патологии
- C. внешнее или внутреннее кровотечение

D. аллергическая реакция на фармакологические препараты

592. МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИХ РАСТВОРОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОМ ШОКЕ У ДЕТЕЙ

- A. 5 мл/кг в час
- B. 10 мл/кг в час
- C. 10-20 мл/кг в час
- D. 20-30 мл/кг в час

593. У БОЛЬНОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ЦИАНОЗ, ЗАПАВШИЙ ЖИВОТ, АНУРИЯ, ГИПОТЕРМИЯ, ТОНИЧЕСКИЕ И КЛОНИЧЕСКИЕ СУДОРОГИ. УКАЖИТЕ СТЕПЕНЬ ДЕГИДРАТАЦИИ

- A. I, потеря жидкости 1-3% от массы тела
- B. II, потеря жидкости 4-6% от массы тела
- C. III, потеря жидкости 7-10% от массы тела
- D. IV, потеря жидкости более 10% от массы тела

594. ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ ВЫЯВЛЯЮТСЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫЕ ЗНАКИ

- A. в течение 6 часов
- B. через 6-24 часа
- C. на 2-3 день
- D. на 4-5 день

595. ДЛЯ ВОДОДЕФИЦИТНОГО ЭКСИКОЗА У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО

- A. холодная, сухая кожа
- B. снижение диуреза, гипертермия
- C. гиповентиляция
- D. снижение мышечного тонуса

596. ДЛЯ СОЛЕДЕФИЦИТНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ ПРИ ЭКСИКОЗЕ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО

- A. кожные покровы со сниженным тургором, цианотичные
- B. брадикардия
- C. низкие цифры АД
- D. все выше перечисленное

597. ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНАЯ СЫПЬ

- A. в течение 6 часов
- B. через 6-24 часа
- C. на 1-3 день
- D. на 4-5 день

598. РЕАБИЛИТАЦИЯ – ЭТО:

- A) смещение акцентов в системе взглядов на здоровье в пользу восстановления максимальной функциональной активности
- B) координированное применение медицинских, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум трудоспособности
- C) профилактика различных заболеваний, а также заболевания организма
- D) профилактика заболеваний и неблагоприятных реакций здорового организма

599. ЦЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИИ:

- A) социальная интеграция больного, который является объектом реабилитации
- B) медицинская часть реабилитационной программы
- C) профилактика различных заболеваний
- D) поддержание структурно-функциональной целостности пораженных органов и тканей

600. ПЕРВЫЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:

- A) функционально-тренирующий (амбулаторно-поликлинический)
- B) лечебно-щадящий (госпитальный)
- C) этап активного восстановления функций (санаторно-курортный)
- D) лечебно-тренирующий

601. ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:

- A) единства этиопатогенетической и симптоматической терапии
- B) индивидуализации конкретных программ медицинской реабилитации
- C) курсового проведения реабилитационных мероприятий на разных этапах
- D) динамического проведения этапов медицинской реабилитации, последовательность прохождения которых может быть различной в зависимости от патологии

602. ПЕРВЫЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРОВОДЯТ В:

- A) санаториях соответствующего медицинского профиля
- B) региональных центрах медицинской реабилитации
- C) реабилитационных центрах поликлиник
- D) специализированных лечебных и реабилитационных отделениях стационаров

603. К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ОТНОСЯТСЯ:

- A) прогнозирование и анализ возможных патологических состояний в соответствующих ситуациях, разработка комплекса мероприятий
- B) дальнейшее повышение работоспособности пациентов путем осуществления программы физической реабилитации с использованием природных и переформированных физических факторов
- C) диспансерное динамическое наблюдение, проведение вторичной профилактики, рациональное трудоустройство пациентов и поддержание или улучшение их трудоспособности
- D) формирование у пациента и его родственников адекватного представления о болезни или травме

604. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БАЗИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:

- A) своевременность начала
- B) этапность мероприятий
- C) комплексность средств
- D) индивидуальный подход

605. ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ В ОРГАНИЗМЕ ОБРАЗУЕТСЯ:

- A) витамин А
- B) витамин В
- C) витамин С
- D) витамин Д

606. ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ С ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- A) нормализацию совершенного механизма дыхания
- B) укрепление дыхательных мышц
- C) предупреждение и ликвидацию застойных явлений в легких
- D) все вышеперечисленное верно

607. РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ:

- A) воздухо- и солнцелечение
- B) водолечение
- C) бальнеолечение
- D) все вышеперечисленное верно

608. К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К ПРИМЕНЕНИЮ МАССАЖА НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- A) острые лихорадочные состояния
- B) хронические заболевания органов пищеварения вне фазы обострения
- C) гнойные процессы любой локализации
- D) тромбоз

609. ЦЕЛЬЮ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

- A) увеличение резервных возможностей аппарата дыхания
- B) увеличение нагрузок
- C) уменьшение нагрузок
- D) снижение сопротивляемости организма

610. ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПРИВИВКУ

- A. только живыми вакцинами
- B. всеми вакцинами, кроме живых
- C. всеми вакцинами
- D. только анатоксинами

611. ЖИВЫМ ВАКЦИНАМ ПРИСУЩИ

- A. вирулентность
- B. антигенность
- C. иммуногенность
- D. способность размножаться в месте введения

612. ЖЕНЩИНА, ПРИВИТАЯ ПРОТИВ КРАСНУХИ, ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНА, ЧТО ЕЙ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ БЕРЕМЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ

- A. 1 месяца после прививки
- B. 2 месяца после прививки
- C. 3 месяца после прививки
- D. 6 месяцев после прививки

613. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЖНО ПРОВОДИТЬ НА ОСНОВАНИИ

- A. негативной кожной аллергической пробы с туберкулином
- B. негативного результата исследования мокроты
- C. отсутствия изменений в легких при флюорографическом обследовании
- D. низком уровне специфических антител.

614. КАКОЙ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИВИВОК КОНТАКТНЫМ СТУДЕНТАМ С БОЛЬНЫМ ДИФТЕРИЕЙ

- A. вакцину АКДС
- B. вакцину АДС-М
- C. противодифтерийную сыворотку

- D. вакцину Адасель
615. КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ МОЖЕТ БЫТЬ МЕЖДУ ВВЕДЕНИЕМ РАЗНЫХ ВАКЦИН
- A. 2 недели
 B. 1 месяц
 C. 2 месяца
 D. 6 месяцев
616. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В РЕБЕНКУ, РОЖДЕННОМУ ОТ HBV SAG – ПОЗИТИВНОЙ МАТЕРИ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВВЕСТИ
- A. вакцину против вирусного гепатита В
 B. специфический иммуноглобулин
 C. специфический иммуноглобулин и вакцину против вирусного гепатита В
 D. иммунобиологические препараты вводить нельзя.
617. СВИДЕТЕЛЬСТВОМ СИЛЬНОЙ ОБЩЕЙ РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- A. выше 39°C
 B. выше 38°C
 C. выше 37°C
 D. выше 40°C
618. ОТ КАКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВАКЦИНИРУЮТ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
- A. пневмококковой инфекции
 B. коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита
 C. вирусного гепатита В
 D. все выше перечисленное
619. ПОСЛЕ ПРИВИВКИ У ПРИВИТОГО ПОЯВИЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА 38,6°C, КАКАЯ ОБЩАЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
- A. слабая
 B. средняя
 C. сильная
 D. нет реакции
620. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ БЦЖ И БЦЖ-М-ВАКЦИН
- A. гемолитическая болезнь
 B. масса тела новорожденного менее 2000 г
 C. реакция Манту с 2 ТЕ положительная
 D. аллергия к яичному белку
621. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ
- A. острые инфекционные и соматические заболевания
 B. обострение хронических патологических процессов
 C. тяжелые аллергические заболевания
 D. все перечисленное верно
622. НАИБОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ БОЛЕЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
- A. живая вакцина
 B. инактивированная вакцина
 C. химическая вакцина
 D. лечебная сыворотка
634. ПАЦИЕНТАМИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) ДОЛЖНЫ БЫТЬ
- A. все взрослые
 B. взрослые, кроме беременных
 C. все возрастно-половые группы населения
 D. взрослые и подростки

635. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ВРАЧОМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМ ВРАЧОМ) НАСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ

- A. 800-1000 человек
- B. 1001-1500 человек
- C. 1501-2000 человек
- D. 2000 и более человек

636. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИНЦИПАМ, КРОМЕ

- A. территориально-участкового
- B. бригадного
- C. ведомственного
- D. частного

637. НЕ ВХОДИТ В ФУНКЦИИ РЕГИСТРАТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ

- A. запись посетителей на прием к врачу
- B. прием вызовов на посещение больных на дому
- C. обеспечение оптимального потока посетителей на исследование
- D. массовое направление посетителей на исследования

638. ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ БОЛЬНЫХ НА ДОМУ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ НЕ ДОЛЖЕН

- A. обеспечить раннее выявление заболевания
- B. своевременно оказывать помощь нуждающимся
- C. посещать больных на дому в день вызова
- D. ежедневно посещать больных на дому без показаний

639. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИКЛИНИКИ

- A. повышение квалификации участковых терапевтов
- B. анализ деятельности участковых терапевтов и контроль за их работой
- C. текущая организационно-методическая и консультативная работа
- D. издание приказов по отделению

640. ОСНОВНЫМИ РАЗДЕЛАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- A. лечебно-диагностической работы в поликлинике и на дому
- B. консультативной работы в поликлинике и на дому
- C. проведения профилактических мероприятий по своему профилю
- D. контроля за деятельностью участкового терапевта

641. ФУНКЦИИ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА СВОДЯТСЯ К СЛЕДУЮЩИМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

- A. оказания населению лечебно-профилактической помощи
- B. проведения санитарных мероприятий
- C. родовспоможения
- D. оказания консультативной помощи больным

642. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ И ФУНКЦИЯМИ СЕЛЬСКОЙ ВРАЧЕБНОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- A. оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению
- B. проведения лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья матери и ребенка

- С. организации диспансерного наблюдения сельских жителей
- Д. осуществления врачебно – трудовой экспертизы

643. В ФУНКЦИИ СЕЛЬСКОЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НЕ ВХОДИТ

- А. оказание амбулаторной лечебно-профилактической помощи населению приписного участка
- В. направление на стационарное лечение больных при соответствующих показаниях
- С. проведение консультативных приемов больных
- Д. организация диспансерного наблюдения

644. В ФУНКЦИИ ФЕЛЬДШЕРСКО–АКУШЕРСКОГО ПУНКТА ВХОДЯТ ВСЕ, КРОМЕ

- А. оказания населению доврачебной медицинской помощи
- В. оценки качества диспансеризации населения
- С. проведения мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населению
- Д. повышения санитарно – гигиенической культуры населения

645. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ЦРБ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ

- А. обеспечения квалифицированной стационарной и поликлинической медицинской помощи населению района и райцентра
- В. оперативного руководства всеми лечебно – профилактическими учреждениями района
- С. организации работы МСЭ
- Д. внедрения передового опыта, инновации и маркетинга

646. ЗАДАЧЕЙ ОБЛАСТНОЙ (КРАЕВОЙ) БОЛЬНИЦЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. обеспечения населения области в полном объеме высокоспециализированной, квалифицированной, консультативной, поликлинической и стационарной помощью
- В. оказания организационно-методической помощи медицинским учреждениям области
- С. оказания экстренной и плановой медицинской помощи
- Д. организации санитарно-эпидемиологических мероприятий в области (крае)

647. В СОСТАВ ОБЛАСТНЫХ БОЛЬНИЦ ВХОДЯТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- А. стационара со специализированными отделениями
- В. консультативная поликлиника
- С. отделения экстренной и плановой помощи
- Д. областное (краевое) бюро медико-социальной экспертизы

648. ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВО – КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

- А. организует и проводит выездные консультации врачей – специалистов
- В. проводит заочные консультации
- С. разрабатывает предложения о порядке и показаниях к направлению больных для консультаций
- Д. организует медицинскую помощь сельскому населению

649. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

- А. анализа деятельности медицинских учреждений области с последующей разработкой мер по улучшению их работы
- В. руководство городскими станциями скорой медицинской помощи
- С. разработки планов первичной специализации и повышения квалификации врачей
- Д. организацию планово-консультативных выездов высококвалифицированных врачей-специалистов

650. ФУНКЦИИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ, КРОМЕ:

- A. административной функции
- B. руководства специализированной медицинской помощью
- C. консультативной
- D. повышения квалификации медицинских кадров

651. С КАКОГО ВОЗРАСТА ДЕТИ СЧИТАЮТСЯ ПО ВОЗ ПОДРОСТКАМИ

- A. с 15 до 18 лет
- B. с 12 до 16 лет
- C. с 15 до 24 лет
- D. с 10 до 18 лет

652. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- A. каждый специалист в отдельности
- B. участковый педиатр
- C. врач дошкольно–школьного отделения
- D. зав. отделением

653. ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В СТАДИИ РЕМИССИИ, КАК ПРАВИЛО, ПРОВОДИТСЯ

- A. ежемесячно
- B. весной и осенью
- C. зимой и летом
- D. ежеквартально

654. К ДЕКРЕТИРОВАННЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В ПЕДИАТРИИ ОТНОСЯТСЯ

- A. 2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет
- B. 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет
- C. 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет
- D. 1 год, 10 лет, 19 лет

655. СТАТИСТИКА – ЭТО:

- A. самостоятельная общественная наука, изучающая количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с их качественной стороной
- B. сбор, обработка и хранение информации, характеризующей количественные закономерности общественных явлений
- C. анализ массовых количественных данных с использованием статистическо-математических методов
- D. статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации

656. МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА – ЭТО:

- A. отрасль статистики, изучающей здоровье населения
- B. совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ
- C. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
- D. отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с гигиеной, планированием и прогнозированием деятельности ЛПУ

657. ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- A. информация о здоровье населения
- B. информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- C. информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения
- D. все вышеперечисленное

658. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ (ИЗУЧАЕТСЯ) КАК

- A. многофакторная проблема, включающая в себя цели по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- B. величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма
- C. многофакторная проблема, включающая в себя задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- D. все вышеперечисленное

659. В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- A. общероссийские показатели
- B. аналогичные показатели соседних территорий
- C. показатели за предыдущие годы
- D. все перечисленное верно

660. СТАТИСТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ (ВЕРНО ВСЕ, КРОМЕ ОДНОГО)

- A. медико-демографические показатели
- B. заболеваемость
- C. инвалидность
- D. временная нетрудоспособность

661. К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОТЕНЦИАЛА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ:

- A. заболеваемости
- B. летальности
- C. инвалидности
- D. смертности

662. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ ИЗУЧАЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, (ВЕРНО ВСЕ, КРОМЕ)

- A. «статику» населения (численность, расселение, плотность и т. д.)
- B. механическое движение населения
- C. естественное движение населения
- D. заболеваемость с временной утратой трудоспособности

663. ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. рождаемость и смертность
- B. летальность
- C. инвалидность
- D. заболеваемость

664. К ОБЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ

- A. рождаемость
- B. смертность
- C. естественный прирост
- D. средняя продолжительность жизни

665. К ОБЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- A. рождаемость
- B. общая смертность
- C. естественный прирост
- D. коэффициент воспроизводства

666. КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПУТЕМ

- A. соотношения численности родившихся в данном году к среднегодовой численности населения
- B. соотношения численности умерших, к численности родившихся
- C. вычитания числа умерших, из числа родившихся
- D. соотношения численности родившихся в данном году к среднегодовой численности женщин фертильного возраста

667. К СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РОЖДАЕМОСТИ ОТНОСЯТСЯ:

- A. показатель плодовитости
- B. показатель общей рождаемости
- C. показатель воспроизводства
- D. все перечисленное верно

668. УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ (НА 1000) НАСЕЛЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В ПРИДЕЛАХ

- A. от 10 до 15
- B. до 10
- C. от 15 до 20
- D. выше 20

669. ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ – ЭТО

- A. отношение числа умерших, к среднегодовой численности населения
- B. отношение числа умерших, к численности населения на 01.01 данного года
- C. общее количество умерших, в течение межпереписного периода
- D. отношение числа умерших, к среднегодовой численности населения соответствующего возраста

670. УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ (НА 1000) НАСЕЛЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- A. от 5 до 10
- B. от 11 до 15
- C. от 16 до 20
- D. выше 20

671. ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

- A. $(\text{число умерших беременных, рожениц, родильниц в течение 42 недель после прекращения беременности} \times 100\,000 \text{ живорожденных}) / \text{число живорожденных}$
- B. $(\text{число умерших беременных} \times 1000 \text{ живорожденных}) / \text{суммарное число беременностей}$

- С. (число умерших после 28 недель беременности x 100 000 живорожденных) / суммарное число беременностей
- Д. (число умерших беременных x 100 000 живорожденных и мертворожденных)/суммарное число беременных после 28 недель

672. ПОКАЗАТЕЛЬ МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛ

- А. (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение первого года жизни) x 1000 / число детей родившихся живыми
- В. (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение 7 дней жизни) x 1000 / число детей родившихся живыми и мертвыми
- С. (число детей родившихся мертвыми и недоношенными) x 1000 / число детей родившихся живыми и мертвыми
- Д. (число детей, родившихся мертвыми) x 1000 / число детей родившихся живыми и мертвыми

673. ПОКАЗАТЕЛЬ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛ

- А. (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение первого года жизни) x 1000 / число детей родившихся живыми
- В. (число детей, умерших в течение 28 дней жизни) x 1000 / число детей родившихся живыми
- С. (число детей, умерших в течение 28 дней жизни) x 1000 / число детей родившихся мертвыми и живыми
- Д. (число детей, умерших в течение 168 часов жизни) x 1000 / число детей родившихся живыми

674. ПОКАЗАТЕЛЬ ПОСТНЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

- А. (число детей, умерших в течение первого года жизни) x 1000 / число детей родившихся живыми
- В. (число детей, умерших в течение 6 месяцев жизни) x 1000 / число детей родившихся живыми
- С. (число детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года) x 1000 / число детей родившихся мертвыми и живыми
- Д. (число детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года) x 1000 / число детей родившихся живыми

675. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ С УЧЕТОМ ЗАНИМАЕМОГО ИМИ МЕСТА

- А. причины перинатального периода и врожденные аномалии, заболевания органов дыхания, кишечные инфекции
- В. прочие болезни, родовой травматизм и пороки развития, желудочно-кишечные заболевания
- С. родовой травматизм и пороки развития, пневмония, прочие болезни
- Д. пневмония, желудочно-кишечные заболевания, родовой травматизм и пороки развития

676. ПОД ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПОНИМАЮТ

- А. совокупность всех антропологических признаков и результаты функциональных измерений
- В. соматоскопические признаки и показатели
- С. данные о телосложении
- Д. г) все вышеперечисленное

677. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВСЕ, КРОМЕ

- A. по причинам смерти
- B. по обращаемости
- C. по данным переписи населения
- D. по данным медицинских осмотров

678. УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПЕЦИАЛЬНОМУ УЧЕТУ

- A. острая инфекционная заболеваемость
- B. важнейшая неэпидемическая
- C. госпитализированная
- D. все вышеперечисленное верно

679. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ

- A. определить влияние факторов образа жизни
- B. наследственного фактора
- C. факторы окружающей среды, условия труда
- D. все перечисленное верно

680. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

- A. хоспис
- B. поликлиника
- C. медсанчасть
- D. станция скорой помощи

681. ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ЭТО

- A. включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий
- B. является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний
- C. ответная реакция организма на болезнь
- D. комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

682. К ЯТРОГЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- A. обусловленные вредными факторами производства
- B. обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медработников
- C. с неблагоприятным прогнозом
- D. наследственного генеза

683. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА ЭТО:

- A. сведения о больном, не подлежащие разглашению в обществе
- B. сведения о больном, которые не должны быть сообщены больному
- C. информация о диагнозе заболевания
- D. все перечисленное

684. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. Решение вопросов медицинской биоэтики
- B. Отдаление смертельного исхода

- C. Максимальное повышение качества жизни
- D. Оказание специализированного ухода

685. К ЗАДАЧАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТСЯ:

- A. Адекватное обезболивание и купирование других физических симптомов
- B. Психологическая поддержка больного и ухаживающих родственников.
- C. Решение социальных и юридических вопросов
- D. Всё вышеперечисленное

686. ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:

- A. Не имеет намерений продления или сокращения срока жизни
- B. Старается насколько возможно долго обеспечить больному активный образ жизни
- C. Улучшает качество жизни пациента и может также положительно влиять на течение болезни

687. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ У ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРИ ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ

- A. крестец
- B. подколенная ямка
- C. бедро
- D. голень

688. ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

- A. умывание
- B. лечебная физкультура
- C. смена положения тела каждые два часа
- D. смена положения тела 3 раза в день

689. ПРИЗНАК ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ

- A. бледность
- B. отек, краснота
- C. пузыри
- D. язвы

690. ЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ

- A. протирание 10% камфорным спиртом
- B. массаж
- C. хирургическим методом
- D. смазывание 70% спиртом

691. БОЛЬ – ЭТО

- A. место развития патологического процесса
- B. осложнение основного заболевания
- C. не только то, что физически ощущает человек, но ещё и эмоциональное переживание
- D. сестринские вмешательства

692. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ПРИЧИНЫ, ИНТЕНСИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ БОЛИ

- A. невербальная оценка интенсивности боли
- B. боль во внутренних органах
- C. интенсивность боли
- D. возможность выражать свои страхи

693. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА

- A. одиночество
- B. риск суицидальной попытки
- C. беспокойство по поводу потери работы
- D. нарушение сна

694. ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ БИОЭТИКИ

- A. моральные и нравственные аспекты взаимоотношения между людьми
- B. профессиональный долг медицинского работника
- C. история медицины
- D. профессиональные знания и умения медицинского работника

695. К ВЕРБАЛЬНОМУ ОТНОСЯТ ОБЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ

- A. мимики
- B. слова
- C. жеста
- D. взгляда

696. ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА

- A. промежуточное между положением лежа на боку и лежа на животе
- B. лежа на спине
- C. лежа на животе
- D. полулежа и полусидя

697. ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА

- A. полулежа, полусидя
- B. на боку
- C. на животе
- D. на спине

698. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОВИСАНИЯ СТОПЫ ПАЦИЕНТА В ПОЛОЖЕНИИ ФАУЛЕРА УПОР ДЛЯ СТОП СТАВИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАД.)

- A. 30
- B. 90
- C. 60
- D. 110

699. ПРИ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- A. активное
- B. пассивное
- C. положение Фаулера
- D. вынужденное

700. КОЖУ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО ПРОТИРАТЬ РАСТВОРОМ

- A. 10% нашатырного спирта
- B. 10% камфорного спирта
- C. 10% калия перманганата
- D. 0,02% фурацилина

701. ПРИ ЧУМЕ ИМЕЮТ МЕСТО ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ И ПУТИ ПЕРЕДАЧИ, КРОМЕ:

- A. трансмиссивного

- В. контактного
- С. парентерального
- Д алиментарного

702. ДЛЯ ЧУМЫ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КРОМЕ:

- А. эпидемии чумы следует за эпизоотиями ее среди грызунов
- В. заболеваемость имеет сезонный характер
- С. возникновение эпидемий чумы обусловлено не только биологическими, но и социально-бытовыми факторами
- Д тяжесть заболевания не связана со штаммом возбудителя чумы

703. В ПАТОГЕНЕЗЕ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ЧУМЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ:

- А. внедрение возбудителя через кожу и слизистые оболочки
- В. возникновение первичного эффекта с трансформацией в чумный карбункул
- С. поражение лимфатических узлов с образованием первичного бубона 1-го, 2-го и т.д. порядка
- Д. все перечисленное

704. ОТМЕТЬТЕ ПРИЗНАКИ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЧУМНОГО БУБОНА:

- А. воспаление лимфоузлов и окружающей клетчатки
- В. кожа над бубоном напряжена, красного или синюшного цвета
- С. отсутствие отека окружающей клетчатки
- Д первичный бубон чаще единичный

705. ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ЧУМЕ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- А. воздушно-капельного пути заражения
- В. геморрагической септицемии
- С. возникновение пневмонических очагов раньше бактериемии
- Д. Отсутствие возбудителей чумы при микроскопии содержимого альвеол

706. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ЧУМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ:

- А. лобулярная пневмония
- В. лобарная пневмония
- С. очаги воспаления различной величины
- Д. все верно

707. ТОКСИНЫ YERSINIA PESTIS ВЫЗЫВАЮТ:

- А. лимфаденит
- В. энцефалит
- С. шок
- Д. все верно

708. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЧУМЫ:

- А. кожную
- В. бубонную
- С. легочную
- Д. все перечисленное.

709. ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВСЕХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ЧУМЫ ХАРАКТЕРНО:

- А. потрясающий озноб, температура 39-400С
- В. мучительная головная боль

- C. шатающаяся походка, невнятная речь
- D. все перечисленное

710. ДЛЯ КОЖНОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ ХАРАКТЕРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КРОМЕ:

- A. последовательные изменения в виде: розеолы, папулы, везикулы и пустулы
- B. изъятие пустулы с появлением темного струпа
- C. образование фликтены
- D. развитие лимфангоита

711. В ОТЛИЧИЕ ОТ СИБИРЕЯЗВЕННОГО КАРБУНКУЛА ПРИ ЧУМЕ:

- A. нет дополнительных пузырьчатых высыпаний вокруг струпа
- B. определяется резкая болезненность при пальпации
- C. содержимое пустулы кровянисто-гнойное с обилием возбудителя чумы
- D. все перечисленные ответы правильные

712. ПРИ БУБОННОЙ ФОРМЕ ЧУМЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КРОМЕ:

- A. воспаленный лимфоузел, регионарный к месту внедрения возбудителя
- B. наличие периаденита, болезненного при пальпации
- C. сглаженность контуров бубона
- D. развитие лимфангоита

713. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ БУБОННОЙ ЧУМЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. септицемия
- B. пневмония
- C. менингит
- D. флегмона

714. ВЫБЕРИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ДЛЯ ПЕРВИЧНО-ЛЕГОЧНОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО

- A. наличие режущих болей в груди, одышка
- B. кашель с пенистой кровавой мокротой
- C. выделение с мокротой огромного количества палочек чумы
- D. все перечисленное

715. ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ЧУМЕ НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

- A. начальный период лихорадочного возбуждения
- B. разгар болезни с максимальным выделением больным возбудителя
- C. терминальный с прогрессирующей одышкой, цианозом, комой
- D. период выздоровления

716. МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НА ЧУМУ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. пунктат из бубона
- B. содержимое везикул, пустул, карбункулов, язв, фликтен
- C. мокрота, слизь из зева
- D. все перечисленное

717. ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЧУМЫ ПРИМЕНЯЮТ:

- A. серологические реакции

- В. люминесцентно-серологический метод
- С. биологическую пробу
- Д. бактериоскопический метод

718. ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА ТУЛЯРЕМИИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ЧУМЫ:

- А. протекает более легко по типу мелкоочаговой пневмонии, бронхоаденита
- В. имеет благоприятный прогноз
- С. ИТШ редко
- Д. все ответы правильные

719. ДЛЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЧУМЫ ПРИМЕНЯЮТ:

- А. стрептомицин
- В. тетрациклины
- С. левомицетин
- Д. все перечисленное

720. ДЛЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЧУМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ:

- А. кристаллоидные и коллоидные растворы
- В. стероидные гормоны
- С. сердечнососудистые препараты
- Д. все перечисленное

721. ПРОФИЛАКТИКА ЧУМЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- А. заражения лиц, работающих с зараженным материалом или подозрительным на зараженность чумой материалом
- В. заболеваний людей и возникновения вспышек в природных очагах
- С. завоза чумы на территорию страны из-за рубежа
- Д. Все перечисленное

722. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА ЧУМЫ:

- А. врачебный осмотр пассажиров
- В. санитарный осмотр грузов, багажа, транспортных средств, следующих через портовые города
- С. обследование и врачебное наблюдение в течение 6 дней за лицами, прибывающими из зон, неблагоприятных по чуме
- Д. все перечисленное

723. СВОЙСТВА ВОЗБУДИТЕЛЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ:

- А. грамположительная бактерия
- В. аэроб, во внешней среде образует споры
- С. вирулентность возбудителя связана со способностью образовывать капсулу в организме и выделять экзотоксин
- Д. все перечисленное.

724. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. больные домашние животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, свиньи
- В. больной человек
- С. бактерионоситель
- Д. все перечисленное

725. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ:

- A. Контактный
- B. Воздушно-капельный
- C. Алиментарный
- D. Трансмиссивный

726. ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ СЛУЖАТ:

- A. Выделения больных животных и их трупы
- B. Пищевые продукты, приготовленные из мяса и молока больных животных
- C. Предметы, изготовленные из инфицированного животного сырья: головные уборы, перчатки, чулки, одеяла, щетки и др.
- D. Все перечисленное.

727. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ:

- A. Высокая устойчивость возбудителя во внешней среде
- B. Наибольшая заболеваемость среди мужчин
- C. Развитие болезни может быть обусловлено характером труд. деятельности и особенностями быта
- D. Все перечисленное.

728. ИММУНИТЕТ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ:

- A. Стойкий
- B. Нестойкий
- C. Отсутствует
- D. Не изучен

729. В ПАТОГЕНЕЗЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ИМЕЕТ МЕСТО:

- A. Внедрение возбудителя через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечный тракт
- B. Поражение регионарных лимфатических узлов
- C. Генерализация процесса при лимфогенном и гематогенном распространении возбудителя
- D. Все перечисленное.

730. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ВСЕМИ ОПИСАННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, КРОМЕ:

- A. Сибирязвенный карбункул на коже
- B. Наличие геморрагического трахеита, плеврита, пневмонии
- C. Лимфаденит
- D. Артрозо-артриты.

731. РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ:

- A. Локализованную (кожную и висцеральную)
- B. Генерализованную вторичную
- C. Сибирязвенный сепсис
- D. Все перечисленные

732. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ РАЗНОВИДНОСТЬЮ КОЖНОЙ ФОРМЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. Карбункулезная
- B. Эдематозная
- C. Буллезная
- D. Эризипеллоидная

733. ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ ПРИ КОЖНОЙ ФОРМЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ:

- A. Зависит от места локализации процесса
- B. Не зависит от места локализации процесса
- C. Не изучена

734. ТИПИЧНЫМИ СИМПТОМАМИ СИБИРЕЯЗВЕННОГО КАРБУНКУЛА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. Наличия язвы с темным дном
- B. Студневидного дрожания отека
- C. Появления "дочерних" пузырьков по периферии язвы
- D. Наличия болезненности в зоне некроза.

735. БУЛЛЕЗНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ КОЖНОЙ ФОРМЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ СОПРОВОЖДАЕТСЯ:

- A. Появлением в области входных ворот возбудителя больших пузырей, наполненных геморр. содержимым
- B. Формированием на их месте обширных язвенно-некротических по-верхностей
- C. Выраженной интоксикацией
- D. Всем перечисленным

736. ПРИ ЭРИЗИПЕЛОИДНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ КОЖНОЙ ФОРМЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЯВЛЯЮТ:

- A. Отек без видимого карбункула в начале болезни
- B. Пузыри, заполненные геморрагическим содержимым
- C. Неглубокие язвы с синюшным дном и обильным серозным отделяемым
- D. Все перечисленное

737. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ИСХОДЫ КОЖНОЙ ФОРМЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ:

- A. Выздоровление
- B. Летальный исход
- C. Вторичная септицемия
- D. Все перечисленное.

738. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОРАЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ВСЕМИ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ, КРОМЕ:

- A. Многократной рвоты "кофейной гущей"
- B. Частого жидкого стула с примесью крови
- C. Развития тендо-вагинитов
- D. Болезненности живота при пальпации

739. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО КОЖНУЮ ФОРМУ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С:

- A. Банальным карбункулом
- B. Рожей
- C. Кожной формой чумы
- D. Язвенно-бубонной формой туляремии

740. ДЛЯ РОЖИ В ОТЛИЧИЕ ОТ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ХАРАКТЕРНЫ:

- A. Четкие контуры воспалительной зоны
- B. Болезненность кожи по периферии воспаления
- C. Отсутствие симптома Стефанского
- D. Все перечисленное.

741. ТУЛЯРЕМИЙНЫЕ ЯЗВЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ:

- A. Поверхностным расположением
- B. Отсутствием черного струпа в центре поражения
- C. Наличием выраженного регионарного лимфаденита
- D. Всем вышеперечисленным.

742. ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ БЕРУТ:

- A. Материал из карбункула
- B. Кровь
- C. Мокроту
- D. Все перечисленное.

743. ИММУНИТЕТ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ:

- A. Стойкий
- B. Нестойкий
- C. Отсутствует

744. ДЛЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ:

- A. Пенициллина
- B. Тетрациклина и его производных
- C. Левомецетина
- D. Бактериофагов.

745. К СРЕДСТВАМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ ОТНОСЯТСЯ:

- A. Стероидные гормоны
- B. Дезинтоксикационные растворы
- C. Свежезамороженная плазма и кровь
- D. Все перечисленное.

746. ПРАВИЛА ВЫПИСКИ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ:

- A. При кожной форме - отторжение струпа и формирование рубца
- B. При септической форме болезни - клиническое выздоровление и дву-кратный отрицательный бактериологический посев крови с интервалом 5 дней
- C. Все перечисленное.

747. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ:

- A. Изоляция и лечение больных животных
- B. Контроль за выпуском и реализацией животного сырья
- C. Вакцинация животных и людей
- D. Все перечисленное.

748. ДЛЯ ЭТИОЛОГИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Возбудитель желтой лихорадки – фильтрующий вирус, размером от 12 до 27нм
- B. Относится к арбовирусам, содержит РНК
- C. Обладает пантропностью, особенно висцеро- и нейротропными свойствами
- D. Устойчив во внешней среде

750. В ПАТОГЕНЕЗЕ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФАЗЫ, КРОМЕ:

- A. Внедрения вируса при укусе комара через кожу
- B. Лимфогенного заноса вируса в регионарные лимфоузлы
- C. Поражения эндотелия капилляров внутренних органов и развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови
- D. Фекально-орального механизма заражения.

751. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКЕ:

- A. Желтуха
- B. Геморрагии внутренних органов
- C. Поражение клубочкового и канальцевого аппарата почек
- D. Все перечисленное.

752. ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКЕ ПРЕДСТАВЛЕН ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, КРОМЕ:

- A. Геморрагической сыпи на коже и слизистых разной величины
- B. Желудочно-кишечных кровотечений
- C. Гематурии
- D. Гемартрозов.

753. ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКЕ:

- A. почечная недостаточность
- B. печеночная недостаточность
- C. геморрагический шок
- D. все верно

754. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ОСНОВАН НА НАЛИЧИИ СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СЛЕДУЮЩИХ ДАННЫХ, КРОМЕ:

- A. Наличия эндемического очага
- B. Типичной двухволновой температурной кривой
- C. Поражения печени и почек
- D. Нейтрофильного лейкоцитоза.

755. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ПРОВОДЯТ С :

- A. Вирусным гепатитом
- B. Лептоспирозом
- C. Малярией
- D. Всем перечисленным.

756. ДЛЯ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ХАРАКТЕРНО:

- A. Желтуха
- B. Геморрагический синдром
- C. Лихорадка
- D. Все перечисленное.

757. ДЛЯ ЛЕПТОСПИРОЗА И ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ХАРАКТЕРНЫ ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ:

- A. Желтухи
- B. Вирусной этиологии
- C. Геморрагического синдрома

758. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. Выделение вируса из крови больного, печени и мозга умерших
- B. Реакция связывания комплимента в титре 1:16 и выше
- C. Реакция нейтрализации вируса
- D. Гистологическая картина биопсии печени

759. ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

- A. Изоляция больного в боксе на первые 5 дней болезни
- B. Уничтожение комаров-переносчиков в эпидемических очагах
- C. Вакцинация населения вакциной 17Д "Дакар"
- D. Все перечисленные.

760. ОСНОВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПЫ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Возбудитель - ДНК содержащий вирус рода ортопоксвирусов, сходен по антигенным свойствам с вирусом натуральной оспы
- B. Циркуляция вируса в естественных условиях поддерживается обезьянами
- C. Чаще болеют дети до 10 лет
- D. Вирус неустойчив во внешней среде.

761. ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. Воздушно-капельного
- B. Воздушно-пылевого
- C. Алиментарного
- D. Контактного-бытового

762. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ВХОДНЫМИ ВОРОТАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ОСПЕ ОБЕЗЬЯН ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. Органы дыхания
- B. Желудочно-кишечный тракт
- C. Кожа
- D. Слизистые оболочки

763. ДЛЯ ПАТОГЕНЕЗА ОСПЫ ОБЕЗЬЯН ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ, КРОМЕ:

- A. Внедрения вируса через дыхательные пути
- B. Вирусемия
- C. Поражение опорно-двигательного аппарата
- D. Токсемия

764. ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПРИ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. Выраженного продромального периода
- B. Лихорадки
- C. Везикулезно-папулезной сыпи на коже и слизистых оболочках
- D. Остеомиелита.

765. ПРОДРОМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ОСПЕ ОБЕЗЬЯН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ:

- A. Острого начала

- В. Повышения температуры выше 390С.
- С. Болей в пояснично-крестцовой области, мышцах
- Д. Нарушения сознания

766. ДЛЯ СЫПИ ПРИ ОСПЕ ОБЕЗЬЯН В РАЗГАРЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ:

- А. Стадийности высыпания: макула-папула-везикула, пустула-корка-рубец
- В. Плотных, многокамерных с пупковидным вдавлением в центре оспенных элементов
- С. Типичной локализации сыпи: лицо, конечности, ладони, подошвы
- Д. Отсутствия кожного зуда.

767. КРИТЕРИЯМИ ТЯЖЕСТИ ПРИ ОСПЕ ОБЕЗЬЯН ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Выраженность интоксикации
- В. Интенсивность высыпаний
- С. Полиорганная недостаточность
- Д. Все перечисленное

768. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПЫ ПРИМЕНЯЮТ:

- А. Вирусологические исследования, метод флюоресцирующих антител
- В. Реакцию непрямой гемагглютинации для обнаружения антигена ви-руса оспы
- С. Реакцию торможения гемагглютинации для обнаружения антител
- Д. Все ответы правильные.

769. ДЛЯ ЭТИОЛОГИИ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ, КРОМЕ:

- А. Возбудитель оспы относится к ДНК содержащим вирусам
- В. Различают 2 разновидности вируса: возбудитель натуральной оспы, возбудитель алястрима
- С. Возбудитель оспы хорошо выдерживает нагревание
- Д. Возбудитель оспы хорошо размножается на хорион-аллантаисной оболочке куриных эмбрионов

770. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Больной человек
- В. Корова
- С. Обезьяна
- Д. Все перечисленное

771. ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Вирусемия
- В. Бактериемия
- С. Первичное поражение эпителиоцитов
- Д. Все перечисленное

772. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. Поражение кожи и слизистых оболочек
- В. Баллонизирующая дегенерация в эпидермисе кожи
- С. Наличие внутри мембраны клеток телец Гварниери
- Д. Все ответы правильные.

773. ВЫСЫПАНИЯ ПРИ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ:

- А. Этапностью

- В. Инфильтратом кожи в основании элементов
- С. Наличием вдавлений в центре везикул
- Д. Всем перечисленным.

774. ОСОБЕННОСТИ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ У ПРИВИТЫХ:

- А. Появление сыпи на 2-3 день заболевания
- В. Чаще сыпь не достигает стадии пустул
- С. Скудность высыпаний
- Д. Все перечисленное.

775. БИОТИПЫ ХОЛЕРНОГО ВИБРИОНА:

- А. Классический холерный вибрион
- В. Холерный вибрион Эль-Тор
- С. Серотипы по О-антигену: тип Огава (содержит фракцию В), тип Инаба (содержит фракцию С), тип Гикошимо (содержит фракции В и С)
- Д. Все перечисленное.

776. ВОЗБУДИТЕЛЬ ХОЛЕРЫ ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, КРОМЕ:

- А. Грамотрицателен
- В. Полиморфен
- С. Элективной средой роста является щелочная пептонная вода и мясо-пептонный агар
- Д. Облигатный анаэроб

777. ДЛЯ ХОЛЕРНОГО ВИБРИОНА ХАРАКТЕРНО ВЫДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТОКСИНОВ:

- А. Токсин бактериальной оболочки - эндотоксин
- В. Токсин клетки - "фактор проницаемости"
- С. Холероген-экзотоксин
- Д. Все перечисленное

778. ВЕДУЩИМ ПУТЕМ ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ ХОЛЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Водный
- В. Пищевой
- С. Контактнo-бытовой
- Д. Все перечисленное

779. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОЛЕРЕ МОГУТ БЫТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- А. Больного человека
- В. Мухи
- С. Реконвалесцента холеры
- Д. Вибрионосителя холеры

780. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ХОЛЕРЫ ЭЛЬ-ТОР ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Длительное вибрионительство после перенесенного заболевания
- В. Наличие значительного количества стертых форм и вибрионительство
- С. Более выраженная резистентность вибрионов к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды
- Д. Все перечисленное

781. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ХОЛЕРЕ ПОДЛЕЖИТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Рвотных масс
- B. Фекалий
- C. Крови
- D. Желчи

782. ПРИ ХОЛЕРЕ ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНТЕНСИВНО РАЗМНОЖАЕТСЯ В:

- A. Желудке
- B. Кишечнике
- C. Кровяном русле
- D. Всех перечисленных органах

783. ДИАРЕЯ ПРИ ХОЛЕРЕ ОБУСЛОВЛЕНА:

- A. Эндотоксинемией
- B. Экзотоксинемией за счет выделения холерогена
- C. Проникновением вибриона в энтероциты
- D. Воспалительными изменениями эпителия тонкой кишки

784. ПОРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ХОЛЕРЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- A. Десквамацией эпителия ворсинок
- B. Некрозом слизистой
- C. Эпителий структурно не поврежден.

785. В ПАТОГЕНЕЗЕ ХОЛЕРЫ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Проникновения и размножения вибрионов в тонком кишечнике
- B. Выделения холерными вибрионами энтеротоксина и нейраминидазы, активирующих системы циклического аденозинмонофосфата
- C. Развития гемоконцентрации, гиповолемии, метаболических расстройств
- D. Потери белков плазмы.

786. ПОТЕРЯ ВОДЫ ПРИ ХОЛЕРЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ:

- A. Внеклеточной жидкости
- B. Внутрисосудистой жидкости
- C. Внутриклеточной жидкости
- D. Все ответы правильны.

787. Испражнения при холере по отношению к плазме крови:

- A. Гипертоничны
- B. Изотоничны
- C. Гипотоничны

788. ТЯЖЕСТЬ БОЛЕЗНИ ПРИ ХОЛЕРЕ ОБУСЛОВЛЕНА:

- A. обезвоживанием
- B. интоксикацией
- C. лихорадкой
- D. потерей белков плазмы

789. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ХОЛЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- A. Резким обезвоживанием всех тканей, сгущением крови
- B. Полнокровием серозных оболочек с точечными кровоизлияниями
- C. Набуханием, полнокровием с мелкими кровоизлияниями слиз. желудка, тонкого и толстого кишечника

D. Всем перечисленным.

790. ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ХОЛЕРЫ:

- A. Холерный энтерит и гастроэнтерит
- B. Холерный алгид
- C. Атипичные формы (стертые формы, "сухая" холера и молниеносные формы)
- D. Все перечисленные.

791. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ХОЛЕРЕ:

- A. 48 часов
- B. От нескольких часов до 5 суток
- C. От 6 до 12 суток
- D. Более 12 суток

792. ТИПИЧНЫЕ ХОЛЕРНЫЕ ИСПРАЖНЕНИЯ ИМЕЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ:

- A. Жидкость типа рисового отвара
- B. Жидкость, окрашенная желчью
- C. Жидкость калового запаха и цвета.

793. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ ХОЛЕРЫ ВКЛЮЧАЮТ:

- A. Все нижеперечисленное
- B. Отсутствие судорог мышц
- C. Умеренно выраженную сухость слизистой рта
- D. Диарею не более 10 раз/сутки

794. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КЛАССИЧЕСКОЙ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ХОЛЕРЫ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Фебрильной температуры
- B. Локальных судорог
- C. Выраженной сухости слизистой рта
- D. Снижения тургора кожи

795. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ХОЛЕРЫ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Субнормальной температуры
- B. Одышки, тотального цианоза
- C. Обезвоживания 3-й - 4-й степени
- D. Везикулезной сыпи.

796. ПРИ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОМ ШОКЕ, ОБУСЛОВЛЕННОМ ХОЛЕРОЙ, ИМЕЕТ МЕСТО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Тахикардии, одышки, цианоза, гипотензии
- B. Менингоэнцефалита
- C. Анурии
- D. Уменьшения массы циркулирующей крови и плазмы, сгущения крови

797. ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ХОЛЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЧИН, КРОМЕ:

- A. Снижения артериального давления
- B. Гиповолемии
- C. Гипокалиемии

D. Нарушения клубочковой фильтрации

798. НЕОТЛОЖНЫМ ЛЕЧЕБНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ХОЛЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. Введение сердечно-сосудистых препаратов
- B. Инфузионная терапия солевыми растворами
- C. Инфузионная терапия белковыми препаратами
- D. Все перечисленное

799. ДЛЯ РЕГИДРАТАЦИИ У БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ ПРИМЕНЯЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ РАСТВОРЫ, КРОМЕ:

- A. Раствора "Трисоль"
- B. Раствора "Дисоль"
- C. Раствора "Квартасоль"
- D. Полиглюкина.

800. РАСТВОР "ДИСОЛЬ" ДЛЯ РЕГИДРАТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ:

- A. Гипокалиемии
- B. Нормальном содержании калия в плазме крови
- C. Гиперкалиемии
- D. Всех перечисленных состояниях

801. РАСТВОРУ "ТРИСОЛЬ", ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ПРИ ХОЛЕРЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ПРОПИСЬ:

- A. Апирогенной воды 1л, хлорида натрия 5г, гидрокарбоната натрия 4г, хлорида калия 1г
- B. Апирогенной воды 1л, ацетата натрия 5г, гидрокарбоната натрия 4г, хлорида калия 1г
- C. Апирогенной воды 1л, хлорида натрия 4,75г; ацетата натрия 3,6г; хлорида калия 1,5г; гидрокарбоната натрия 1г

802. К ПРЕПАРАТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. Тетрациклинов
- B. Левомецетина (хлорамфеникол)
- C. Фторхинолонов
- D. Пенициллина

803. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПРАЖНЕНИЙ И ТРУПНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ХОЛЕРУ ВКЛЮЧАЕТ:

- A. Микроскопию препаратов, окрашенных по Граму
- B. Посев материала на среды накопления (щелочная пептонная вода) и твердые (щелочной агар)
- C. Идентификацию выделенной культуры по сумме биологических свойств: антигенная структура, ферментативная активность, чувствительность к фагам
- D. Все перечисленное.

804. К ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОТНОСИТСЯ:

- A. цикличность
- B. наличие возбудителя
- C. формирование иммунитета после перенесенного заболевания
- D. все перечисленное

805. СПЕЦИФИЧЕСКИМИ НАЗЫВАЮТ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ:

- A. возбудителем данного заболевания и являющиеся следствием необычной выраженности клинических проявлений и морфофункциональных изменений
- B. микроорганизмами другого вида
- C. обострением хронических соматических заболеваний
- D. присоединением острых соматических заболеваний

806. К СПЕЦИФИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ:

- A. бактериологический метод
- B. серологический метод
- C. вирусологический метод
- D. все перечисленное

807. ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРОТЕРАПИИ МОЖЕТ БЫТЬ:

- A. анафилактический шок
- B. гиповолемический шок
- C. травматический шок
- D. инфекционно-токсический шок

808. К АНТИБИОТИКАМ ОТНОСЯТСЯ:

- A. цефалоспорины
- B. фторхинолоны
- C. нитрофураны
- D. сульфаниламиды

809. К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ:

- A. антибактериальную терапию, регидратационную терапию, витаминотерапию
- B. этиотропную терапию, патогенетическую терапию, симптоматическую терапию
- C. противовирусную терапию, серотерапию, вакцинотерапию
- D. противопаразитарную терапию, противошоковую терапию, диуретическую терапию

810. ПРИ ВВЕДЕНИИ ИММУННЫХ СЫВОРОТОК И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ОРГАНИЗМЕ РАЗВИВАЕТСЯ:

- A. естественный активный иммунитет
- B. искусственный активный иммунитет
- C. естественный пассивный иммунитет
- D. искусственный пассивный иммунитет

811. ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН В ОРГАНИЗМЕ РАЗВИВАЕТСЯ:

- A. естественный активный иммунитет
- B. искусственный активный иммунитет
- C. естественный пассивный иммунитет
- D. искусственный пассивный иммунитет

812. ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ВАКЦИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. БЦЖ
- B. Энджерикс-В
- C. АКДС
- D. АДС-М

813. ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ АНТИГЕНОВ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- A. вирус парагриппа
- B. риновирус
- C. вирус гриппа А
- D. аденовирус

814. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГРИППА:

- A. пищевой
- B. воздушно-капельный
- C. трансмиссивный
- D. вертикальный

815. ПОРАЖЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГРИППЕ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО НА УРОВНЕ:

- A. носа и его придаточных пазух
- B. гортани
- C. трахеи
- D. бронхиол

816. ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПРИ РИНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ:

- A. ринита
- B. трахеита
- C. ларингита
- D. тонзиллита

817. В 80 – 90% СЛУЧАЕВ ПЕРВИЧНЫЙ ПРОСТОЙ ГЕРПЕС ПРОТЕКАЕТ:

- A. в виде ОРЗ
- B. в виде тяжелой генерализованной инфекции
- C. бессимптомно
- D. в виде острой кишечной инфекции

819. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОРАЖЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1-ГО ТИПА:

- A. слизистая оболочка половых органов
- B. слизистая оболочка губ
- C. кожа туловища
- D. кожа волосистой части головы

820. ТИПИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЫПИ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ:

- A. папула
- B. везикула
- C. розеола
- D. петехия

821. МЕСТО ПЕРСИСТИРОВАНИЯ ВИРУСА HERPES ZOSTER В ОРГАНИЗМЕ:

- A. слюнные железы
- B. чувствительные ганглии
- C. кожа и слизистые оболочки
- D. миндалины

822. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТА:

- A. бластов
- B. атипичных мононуклеаров
- C. ретикулоцитов
- D. акантоцитов

823. ТУПЫЕ ТЯНУЩИЕ БОЛИ В ОКОЛОУШНОЙ ОБЛАСТИ, ПРИПУХЛОСТЬ ПЕРЕД УШНОЙ РАКОВИНОЙ, ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ С НАКЛОНОМ В ПОРАЖЕННУЮ СТОРОНУ, СУХОСТЬ ВО РТУ ЯВЛЯЮТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ:

- A. гриппа
- B. инфекционного мононуклеоза
- C. эпидемического паротита
- D. дифтерии

824. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА:

- A. проводится по эпидемическим показаниям
- B. входит в Национальный календарь профилактических прививок
- C. проводится по индивидуальным показаниям
- D. не проводится

825. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. человек, больной острой формой заболевания
- B. животное
- C. человек, больной хронической формой заболевания
- D. все перечисленное

826. НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. вирус гепатита А
- B. вирус гепатита В
- C. вирус гепатита С
- D. вирус гепатита Д

827. МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНФИЦИРОВАННОЙ КРОВИ, ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В СОСТАВЛЯЕТ:

- A. 10 мл
- B. 0,1 мл
- C. 1 мл
- D. 10 мл

828. ПРЯМЫМИ ПРИЗНАКАМИ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. повышение уровня АлАТ и АсАТ в сыворотке крови
- B. повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови
- C. лейкоцитоз
- D. все перечисленное

829. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. высокая частота хронизации
- B. большая частота неблагоприятных исходов у беременных
- C. парентеральный механизм передачи
- D. склонность к эпидемическому распространению в регионах с холодным климатом

830. ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А С ПОЯВЛЕНИЕМ ЖЕЛТУХИ САМОЧУВСТВИЕ БОЛЬНОГО:

- A. ухудшается
- B. улучшается
- C. остается прежним
- D. резко ухудшается после кратковременного улучшения

831. В 80 – 90% СЛУЧАЕВ ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С ПРОТЕКАЕТ В:

- A. субклинической или безжелтушной форме
- B. желтушной форме
- C. тяжелой форме с выраженной желтухой и частым присоединением осложнений
- D. фульминантной форме

832. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

- A. HBsAg
- B. HAV IgM
- C. HCV Ab
- D. HDV Ab

833. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. человек в любой стадии заболевания
- B. животные
- C. окружающая среда
- D. все перечисленное

834. К ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕ ОТНОСИТСЯ:

- A. пищевой
- B. половой
- C. вертикальный
- D. парентеральный

835. НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В:

- A. Западной Европе
- B. России
- C. Африке южнее Сахары
- D. Северной Америке

836. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ ДИЗЕНТЕРИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. микроскопия испражнений (копрограмма)
- B. ирригоскопия
- C. бактериологическое исследование испражнений
- D. бактериологическое исследование крови

837. ПРИСТУП 3-Х ДНЕВНОЙ МАЛЯРИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ:

- A. через 24 часа
- B. через 36 часов
- C. через 48 часов
- D. через 60 часов

838. НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ:

- A. лихорадкой

- В. болями в животе
- С. расстройством стула
- Д. рвотой и диареей одновременно

839. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- А. отсутствием лихорадки
- В. экзантемой
- С. гепатоспленомегалией
- Д. олигурией

840. ИНВАЗИВНЫЙ ТИП ДИАРЕЙНОГО СИНДРОМА НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ:

- А. холеры
- В. дизентерии Флекснера
- С. сальмонеллеза
- Д. энтерогеморрагического эшерихиоза

841. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ХАРАКТЕРНО:

- А. жидкий стул с зеленью и слизью
- В. появление в начале заболевания рвоты, а затем жидкого стула
- С. кратковременная лихорадка
- Д. жидкий, обильный стул без патологических примесей

842. СПАЗМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (ПЕРИОД СУДОРОЖНОГО КАШЛЯ) КОКЛЮША ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ, КРОМЕ:

- А. выраженным инфекционным токсикозом
- В. приступами спазматического кашля с репризами
- С. одутловатостью лица, припухлостью век
- Д. язвочкой на уздечке языка

843. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ ЖИВЫМИ ВАКЦИНАМИ:

- А. первичные иммунодефицитные состояния
- В. местная аллергическая реакция на аминокликозиды
- С. атопический дерматит
- Д. аллергические реакции на яичный белок

844. К ИСТИННЫМ ЖЕЛТУХАМ ОТНОСИТСЯ:

- А. билирубиновая
- В. каротиновая
- С. лекарственная
- Д. токсическая

845. К ПРИЧИНАМ ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА НЕ ОТНОСИТСЯ:

- А. гастрит
- В. холангит
- С. опухоль общего желчного протока
- Д. увеличение портальных лимфатических узлов

846. ДЛЯ ГИПЕРТОКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ХАРАКТЕРНО:

- А. приступообразный кашель
- В. анурия

- C. падение артериального давления
- D. фебрильная температура тела

847. ДЛЯ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ НЕ ХАРАКТЕРНО:

- A. сыпь вначале появляется на волосистой части головы, лице
- B. острое начало
- C. геморрагическая сыпь
- D. фебрильная лихорадка

848. ДИАРЕЙНЫЙ СИНДРОМ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ БОЛЬНЫХ С:

- A. риновирусной инфекцией
- B. аденовирусной инфекцией
- C. энтеровирусной инфекцией
- D. ротавирусной инфекцией

849. ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- A. противодифтерийной сыворотки
- B. сульфаниламидов
- C. оксигенотерапии
- D. гемодиализа

850. ФИЗИОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ МЕСТО В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ:

- A. гриппом
- B. дизентерией Зонне
- C. хроническим бруцеллезом
- D. бешенством

851. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ ОТНОСИТСЯ:

- A. чума
- B. желтая лихорадка
- C. холера
- D. все перечисленные

852. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ К СЕКРЕТОРНЫМ ДИАРЕЯМ НЕ ОТНОСЯТ:

- A. кишечный иерсиниоз
- B. холеру
- C. ротавирусную инфекцию
- D. энтероинвазивный шерихиоз

853 СЫПЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭТАПНО ПРИ:

- A. кори
- B. скарлатине
- C. ветряной оспе
- D. псевдотуберкулезе

854. В ТЕРАПИИ КОКЛЮША ИСПОЛЬЗУЮТ:

- A. макролиды, противокашлевые препараты
- B. сульфаниламиды, противокашлевые препараты
- C. пенициллины, противокашлевые препараты
- D. нитрофураны, противокашлевые препараты

855. ЛЕЧЕБНОЙ АНТИТОКСИЧЕСКОЙ СЫВОРОТКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. противобруцеллезная
- B. противоботулиническая
- C. противосибиреязвенная
- D. противознцефалитная

856. ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УСТАНОВИТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ В МАТЕРИАЛЕ БОЛЬНОГО:

- A. бактериологический
- B. серологический
- C. аллергологический.
- D. кожно — аллергический

857. ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ:

- A. транспортом больницы
- B. скорой помощью
- C. машиной эпидемиологического бюро города
- D. городским транспортом

858. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ:

- A. воздушно — капельный
- B. фекально — оральный.
- C. парентеральный
- D. воздушно — пылевой

859. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАССИВНОГО ИММУНИТЕТА ВВОДЯТ:

- A. антибиотики
- B. вакцины
- C. сыворотки
- D. анатоксины

860. В ИНФЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

- A. СПИРТЫ
- B. кислоты
- C. хлорсодержащие препараты
- D. синтетические моющие средства

861. ПРИ ДИАГНОСТИКЕ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ:

- A. кровь
- B. мочу
- C. кал
- D. желчь

862. В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ БОЛЬНОГО ПРОВОДИТСЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

- A. профилактическая
- B. специфическая
- C. текущая
- D. заключительная

863. ПРИ ЛЮБОЙ ИНФЕКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБРАБОТАТЬ:

- A. посуду больного

- В. одежду больного
- С. выделения больного
- Д. постельное белье

864. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ БЕРЕТСЯ:

- А. кал
- В. моча
- С. кровь
- Д. мокрота

865. ПРИ НАДАВЛИВАНИИ ПАЛЬЦЕМ НЕ ИСЧЕЗАЕТ:

- А. розеола
- В. геморрагия
- С. папула
- Д. пустула

866. АНТИБИОТИКИ НЕ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ НА:

- А. бактерии
- В. вирусы
- С. грибы

867. ВОЗБУДИТЕЛЬ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ГРУППЕ АНАЭРОБНЫХ МИКРОБОВ:

- А. сальмонелла
- В. столбнячная бактерия
- С. шигелла
- Д. стрептококки

868. ТИПИЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ:

- А. пневмония
- В. перфорация язвы кишечника
- С. паротит
- Д. менингит

869. ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ КАЛ ИМЕЕТ ВИД:

- А. «болотной тины»
- В. «ректального плевка»
- С. «горохового пюре
- Д. малинового желе»

870. ЛЕТНЕ - ОСЕННИЙ ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИМЕЕТ:

- А. дизентерия
- В. грипп
- С. бруцеллез
- Д. менингококковая инфекция

871. БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ:

- А. постоянные, ноющего характера
- В. появляются только после акта дефекации
- С. схваткообразные, усиливаются перед актом дефекации
- Д. острые - „кинжальные“

872. ЛЕЧЕБНАЯ МАСЛЯНАЯ КЛИЗМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:

- A. ботулизма
- B. хронической дизентерии
- C. сальмонеллеза
- D. холеры

873. ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ДИЗЕНТЕРИИ:

- A. стул со слизью и кровью
- B. головная боль
- C. лихорадка
- D. постоянные боли в животе

874. ПРИ ХОЛЕРЕ КАЛ ИМЕЕТ ВИД:

- A. “рисового отвара”
- B. «ректального плевка»
- C. «малинового желе»,
- D. “болотной тины»

875. В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕРЫ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДИТ БОРЬБА С:

- A. интоксикацией
- B. обезвоживанием
- C. гипертермией
- D. гипотермией

876. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ:

- A. восполнение дефицита воды и солей и этиотропное лечение
- B. дезинтоксикация
- C. этиотропное лечение
- D. спазмолитики

877. ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХОЛЕРЕ:

- A. бактериологический
- B. серологический
- C. биологический
- D. кожно-аллергическая проба

878. ПРИ ХОЛЕРЕ СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕГИДРАТАЦИИ:

- A. подогревают до температуры тела
- B. подогревают до 40-42 С
- C. комнатной температуры
- D. температурный режим не имеет значения

879. ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ:

- A. трехкратное исследование кала и однократное исследование желчи
- B. однократное исследование кала и однократное исследование желчи
- C. двукратное исследование кала
- D. двукратное исследование кала и однократное исследование желчи

880. СИМПТОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ:

- A. повышение температуры тела
- B. полиурия
- C. кожная складка расправляется быстро
- D. олигурия

881. ВОЗБУДИТЕЛЬ ХОЛЕРЫ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ:

- A. вирусов
- B. простейших
- C. бактерий
- D. грибов

882. ПРИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ РВОТА:

- A. не приносит облегчения
- B. приносит облегчение
- C. возникает при резком вставании больного
- D. не связана с приемом пищи

883. ДОНОР ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА:

- A. дизентерия
- B. сибирскую язву
- C. вирусный гепатит «В»
- D. бруцеллез

884. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА:

- A. промывание желудка + обильное питье
- B. ампициллин внутримышечно
- C. витамины
- D. парентеральное введение солевых растворов

885. ПРИ БОТУЛИЗМЕ БОЛЬНОЙ ПОГИБАЕТ ОТ:

- A. пневмонии
- B. миокардита
- C. паралича дыхания
- D. почечной недостаточности

886. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОТУЛИЗМЕ:

- A. промывание желудка + сифонная клизма
- B. борьба с гипертермией
- C. искусственная вентиляция легких
- D. левомицетин

887. СРОК ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПОСЛЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В»:

- A. один год
- B. шесть месяцев
- C. три месяца
- D. один месяц

888. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «А» КОНТАКТНЫМ НЕОБХОДИМО:

- A. введение антибиотиков
- B. введение гамма-глобулина, наблюдение 35 дней
- C. наблюдение 35 дней
- D. введение вакцины

889. БАЗИСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ «А»:

- A. постельный режим и диета

- В. антибиотики
- С. гормоны
- Д. введение гамма — глобулина

890. ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ:

- А. полная утрата сознания и отсутствие рефлексов
- В. температура 39 град. С
- С. возбуждение
- Д. судороги

891. ГЕПАТИТ «А» И «В» ОБЪЕДИНЯЮТ:

- А. способ заражения
- В. меры профилактики
- С. поражения печени
- Д. поражение селезенки

892. ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В»:

- А. мытье овощей и фруктов
- В. применение только одноразовых шприцов
- С. употребление кипяченой воды
- Д. дезинфекция выделений

893. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ГРИППЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

- А. антибиотики
- В. ремантадин
- С. витамины
- Д. кортикостероиды

894. ТАКТИКА МЕД. ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭПИДЕМИИ ГРИППА В ШКОЛЕ:

- А. работа в обычном режиме
- В. выступление по школьному радио с беседой на тему: «Грипп, пути передачи, клиника и профилактика.»
- С. контроль пищеблок.
- Д. кварцевание помещений

895. СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГРИППА:

- А. лимфаденит
- В. высокая лихорадка
- С. обильные выделения из носа
- Д. боль в горле

896. ОСЛОЖНЕНИЕ, ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПОСЛЕ ГРИППА:

- А. пневмония
- В. менингит
- С. артрит
- Д. отит

897. ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНА ТЕМПЕРАТУРА (В ГРАД. С):

- А. 35,5
- В. 36,8
- С.) 38,0
- Д. 39,0-40,0

898. МЕРЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА:

- A. изоляция больных
- B. введение противогриппозной вакцины
- C. ношение четырехслойной маски
- D. кварцевание помещений

899. КАТАРАЛЬНЫЙ СИМПТОМ ПРИ ГРИППЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА:

- A. 1 сутки болезни
- B. 2-3 сутки болезни
- C. 5-6 день болезни
- D. 7-8 день болезни

900. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА:

- A. ингибиторы нейроминидазы
- B. антибиотики
- C. ацетилсалициловая кислота
- D. сульфаниламидные препараты

901. СРОК ЗАБОРА СМЫВОВ ИЗ НОСОГЛОТКИ ПРИ ГРИППЕ:

- A. 1-3 день болезни
- B. 4-5 день болезни
- C. 5-7 день болезни
- D. 8-10 день болезни

902. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛИХОРАДКИ ПРИ ГРИППЕ:

- A. 2-4 дня
- B. 5-6 дней
- C. 7 дней
- D. 12 дней

903. СИМПТОМ ГРИППА:

- A. температура 38,0-39,0 град. C
- B. головная боль в затылочной области
- C. боль в животе
- D. влажный кашель

904. ОСНОВНОЙ СИМПТОМ МЕНИНГИТА:

- A. ригидность мышц затылка, симптом Кернига
- B. парез конечностей
- C. везикулезная сыпь
- D. геморрагическая сыпь

905. К ОСОБЕННОСТЯМ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ ВСЕ, КРОМЕ:

- A. Слабо выраженной дифференцированности реакций организма
- B. Склонности к затяжному течению и генерализации
- C. Частоты участия в качестве этиологических факторов представителей условно-патогенных бактерий)
- D. Аллергической настроенности

906. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ:

- A. Острая кровопотеря

- В. Экзикоз 1-2 степени у ребенка нормотрофика
- С. Инфекционно-токсический и гиповолемический шок
- Д. Токсико-дистрофическое состояние

907. ВЕДУЩИМИ СИМПТОМАМИ ТОКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ:

- А. Высокой температуры, адинамии, рвоты, анорексии
- В. Распространенных налетов в ротоглотке, боли при глотании
- С. Отека миндалин и ротоглотки
- Д. Стенотического дыхания

908. КАКОЙ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ У РЕБЕНКА С ПОСТЕПЕННЫМ НАЧАЛОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫРАЖЕННЫМ РИНИТОМ, КАШЛЕМ И КОНЬЮНКТИВИТОМ?

- А. Грипп
- В. Парагрипп
- С. Энтеновирусное заболевание
- Д. Аденовирусное заболевание

909. ОСТРОЕ НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 39 GR., КРАТКОВРЕМЕННЫМИ КЛОНИКО-ТОНИЧЕСКИМИ СУДОРОГАМИ И ЛАРИНГИТОМ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО ДЛЯ:

- А. Аденовирусной инфекции
- В. Гриппа
- С. ОРВИ
- Д. Энтеновирусной инфекции

910. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КРУПА?

- А. Гриппозная
- В. Парагриппозная
- С. Аденовирусная
- Д. Микоплазмозная

911. САЛЬМОНЕЛЛЕЗ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРОТЕКАЕТ ЧАЩЕ ПО ТИПУ:

- А. Септического процесса
- В. Пищевой токсикоинфекции
- С. Энтероколита
- Д. Бактерионосительства

912. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПОВТОРНОМ ВЫДЕЛЕНИИ САЛЬМОНЕЛЛ НА ФОНЕ НОРМАЛЬНОГО СТУЛА?

- А. Фуразолидон
- В. Полимиксин
- С. Сальмонеллезный фаг
- Д. Ванкомицин

913. ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А?

- А. Сезонность заболевания
- В. Периодичность эпидемических подъемов
- С. Длительной персистенции вируса в организме человека
- Д. Заболеваемости в определенной возрастной группе

914. ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В?:
- А. Распространение на определенных территориях
 - В. Преимущественная заболеваемость детей первого года жизни
 - С. Регистрации преимущественно на территории Средней Азии
 - Д. Периодичность и сезонность заболевания
915. КАКИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ?
- А. Стафилококки
 - В. Менингококки
 - С. Грам-отрицательные бактерии
 - Д. Листерии
916. ДЛЯ ЛИСТЕРИОЗА НОВОРОЖДЕННЫХ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФОРМ, КРОМЕ:
- А. Сепсиса
 - В. Пневмонии
 - С. Бессимптомного носительства
 - Д. Энтерита, энтероколита
917. ПРИ ОСТРОМ ВРОЖДЕННОМ ТОКСОПЛАЗМОЗЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАБЛЮДАЮТСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ, КРОМЕ:
- А. Поражения ЦНС (менингоэнцефалит)
 - В. Поражения глаз
 - С. Гепато- и спленомегалии
 - Д. Полиартрита
918. ОСТРОЕ НАЧАЛО, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, СТЕНОТИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ, ИЗМЕНЕННЫЙ ГОЛОС, ГРУБЫЙ КАШЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:
- А. ОРЗ, крупа
 - В. Дифтерийного крупа
 - С. Эпиглоттита
 - Д. Инородного тела гортани
919. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛОКАЛИЗОВАННУЮ ДИФТЕРИЮ РОТОГЛОТКИ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА:
- А. Вводится немедленно во всех случаях
 - В. Вводится немедленно, если ребенок не привит
 - С. Может быть введена через 18 - 24 часа по данным наблюдения за больным
 - Д. Не вводится
920. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ МОЛНИЕНОСНОЙ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
- А. Температуры с тенденцией к снижению
 - В. Экзикога 2-3 степени
 - С. Олигоанурии
 - Д. Прогрессирующих гемодинамических и дыхательных расстройств
921. ПИГМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫСЫПАНИЯ ПРИ КОРИ, А ТАКЖЕ:
- А. Скарлатине
 - В. Ветряной оспе

- C. Энтеровирусной инфекции
- D. Токсидермии

922. ЛОКАЛИЗАЦИЯ СЫПИ ПРИ КРАСНУХЕ ТИПИЧНА:

- A. Область волосистой части головы, лицо, дистальные отделы конечностей
- B. Лицо, спина, преобладание на разгибательной поверхности конечностей и в области суставов, ягодиц
- C. Туловище, ладони и стопы
- D. Лицо, боковые зоны туловища, сгибательная поверхность конечностей

923. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ БЕРЕМЕННОЙ В ПОЗДНИЕ СРОКИ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ВОЗМОЖНО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. Преждевременных родов
- B. Формирования пороков развития
- C. Заболевания ветряной оспой новорожденного
- D. Отсутствия влияния на плод и новорожденного

924. ДЛЯ РЕСПИРАТОРНО-СИНТИЦИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРЕН:

- A. Судорожный синдром
- B. Синдром крупа
- C. Бронхообструктивный синдром
- D. Диарейный синдром

925. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ГРИППА РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 2 ЛЕТ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ:

- A. Лейкоцитарный интерферон
- B. Противогриппозный иммуноглобулин
- C. Ремантадин
- D. Симптоматические средства

926. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ОСТРЫХ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. грамположительные бактерии
- B. грамотрицательные бактерии
- C. простейшие
- D. респираторные вирусы

927. ПНЕВМОЦИТОЗОМ БОЛЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО:

- A. новорожденные и дети первых месяцев жизни
- B. дети в возрасте до 2-х лет
- C. дети любого возраста и взрослые с полноценным иммунитетом
- D. дети и взрослые, независимо отвозраста, с нарушениями иммунитета

928. ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. вирус гриппа
- B. вирус парагриппа
- C. ротавирус
- D. вирус простого герпеса

929. ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ У БОЛЬНОГО САЛЬМОНЕЛЕЗОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИССЛЕДОВАТЬ:

- A. кровь
- B. испражнения
- C. рвотные массы и желчь
- D. все перечисленное

930. СРЕДИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ 1 ГОДА ЖИЗНИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ:

- A. вирусный гепатит А
- B. вирусный гепатит В
- C. вирусный гепатит Е
- D. вирусный гепатит D

931. РАЗВИТИЕ ЖЕЛТУХИ ВОЗМОЖНО ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ, КРОМЕ:

- A. инфекционного мононуклеоза
- B. ЦМВ
- C. желтой лихорадки
- D. герпетической инфекции

932. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. менингококковый
- B. пневмококковый
- C. менингит, вызванный гемофильной палочкой Афанасьева - Пфейффера
- D. стафилококковый

933. ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ЭНЦЕФАЛИТЫ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПОСЛЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРИВИВОК, КРОМЕ:

- A. АКДС
- B. полиомиелитной
- C. коревой
- D. паротитной

934. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ ГЕРПЕСА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. офтальмогерпес
- B. генетальный герпес
- C. острый герпетический стоматит
- D. энцефалит

935. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЛИСТЕРИОЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. пневмония
- B. гепатит
- C. энтерит
- D. все перечисленные

936. К ПРОЯВЛЕНИЯМ ВРОЖДЕННОГО ХЛАМИДИОЗА ОТНОСЯТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. конъюнктивита
- B. вульвита, уретрита
- C. генерализованной формы с менингоэнцефалитом

D. остеомиелита, артрита

937. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ АКДС-ВАКЦИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ, КРОМЕ:

- A. неврологических осложнений
- B. аллергических осложнений
- C. гипертермии
- D. диареи с выраженным эксикозом

938. К КОМБИНИРОВАННЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. ампиокса
- B. салазопиридазина
- C. полимиксинов
- D. бисептола

939. К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. крапивницы
- B. отека Квинке
- C. анафилактического шока
- D. агранулоцитоза и апластической анемии

940. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОРМОНОВ У ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ, КРОМЕ:

- A. инфекционно-токсического шока
- B. отека-набухания головного мозга, вирусных и поствакцинальных энцефалитов
- C. выраженных аллергических и аутоиммунных реакций
- D. обезвоживания II-III степени

941. ПОЯВЛЕНИЕ СКАРЛАТИНОПОДОБНОЙ СЫПИ ВОЗМОЖНО ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КРОМЕ:

- A. стафилококковой инфекции
- B. краснухи
- C. псевдотуберкулеза
- D. инфекционного мононуклеоза

942. ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПАРОТИТЕ НАЗНАЧАЮТ:

- A. антибиотики группы пенициллина, симптоматические средства
- B. макролиды, иммуноглобулины, симптоматические средства
- C. симптоматические средства, глюкокортикоиды по показаниям
- D. иммуноглобулин, симптоматические средства

943. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ СИНДРОМ КРУПА?

- A. от 5-6 мес. до 1 года
- B. 1-2 лет
- C. 3-7 лет
- D. старше 7 лет

944. В ЛЕЧЕНИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА ПРИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ИМЕЮТ СУЩЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ:

- A. антибиотики
- B. гипосенсибилизирующие средства
- C. муколитические препараты
- D. препараты с бронхолитическим действием

945. ЭНТЕРОИНВАЗИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КИШЕЧНИКА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ:

- A. дизентерии
- B. иерсиниоза
- C. коли-инфекции, вызванной энтеротоксигенными эшерихиями (ЭТЭ)
- D. дизентерии и иерсиниоза

946. ДЛЯ КОЛИ-ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ЭНТЕРОПАТОГЕННЫМИ ЭШЕРИХИЯМИ (ЭПЭ), НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ, КРОМЕ:

- A. рвоты, срыгивания
- B. водянистой диареи
- C. гемоколита
- D. эксикоза от I до III степени

947. ЖЕЛТУХА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

- A. сепсиса
- B. лептоспироза
- C. псевдотуберкулеза
- D. сыпного тифа

948. ВТОРИЧНЫЕ МЕНИНГИТЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ВСЕХ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КРОМЕ:

- A. пневмонии
- B. сальмонеллеза
- C. иерсиниоза
- D. дифтерии

949. ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ГРИБКОВЫХ МЕНИНГИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. подострого начала болезни с субфебрилитетом
- B. острого начала болезни с гипертермией
- C. вялого течения
- D. прогрессирующей гидроцефалии

950. НАИБОЛЕЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ НА ЦМВ-ИНФЕКЦИЮ СИМПТОМОМ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. гепатомегалия
- B. желтуха
- C. спленомегалия
- D. правильно все

951. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КРОМЕ:

- A. лихорадочной
- B. герпангины
- C. миалгии

D. крупа

952. К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ КОРЕВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. энцефалической (судорожной) реакции
- B. аллергических реакций (сыпь, отек Квинке, артралгия)
- C. токсических реакций (гипертермия, интоксикация)
- D. диарейного синдрома с выраженным эксикозом

953. ОСНОВНОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ БИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. лактобактерии
- B. бифидобактерии
- C. кишечные палочки
- D. энтерококки

954. К ЭНТЕРОСОРБЕНТАМ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КРОМЕ:

- A. смекты
- B. регидрона, глюкосолана
- C. полифепана
- D. полисорба

955. ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЯЖЕСТЬ ТОКСИЧЕСКИХ ФОРМ ДИФТЕРИИ?

- A. характер наложений в ротоглотке
- B. длительность лихорадки
- C. время нарастания интоксикации
- D. сроки появления и распространенность отека шейной клетчатки

956. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ КОКЛЮША ПРИМЕНЯЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ:

- A. антибиотиков
- B. специфического иммуноглобулина
- C. кислородотерапии
- D. гормонов

957. МИТИГИРОВАННАЯ КОРЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- A. укороченным инкубационным периодом
- B. облегчением клинических проявлений
- C. отсутствием высыпания
- D. выраженным конъюнктивитом, кашлем и обильной сыпью

958. ЭМБРИО- И ФЕТОТОКСИЧНОСТЬ КРАСНУШНОГО ВИРУСА В СЛУЧАЯХ ИНФИЦИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОЙ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ:

- A. мертворождением
- B. врожденным уродством (патология ЦНС, глаз, сердца, скелета и др.)
- C. хронической персистирующей инфекцией, субклинической формой врожденной краснухи
- D. всем перечисленным

959. ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ МОГУТ ЛОКАЛИЗОВАТЬСЯ:

- A. на конъюнктивах
- B. на деснах, языке, слизистой оболочке щек, неба
- C. на слизистых оболочках половых органов

D. на слизистой оболочке носа, гортани

960. ДЛЯ СИНДРОМА КРУПА ТИПИЧНО:

- A. учащенное дыхание
- B. шумное, глубокое дыхание
- C. стенотическое дыхание
- D. дыхание с затрудненным выдохом

961. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИОЛИТА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ:

- A. препараты, улучшающие микроциркуляцию
- B. гормоны
- C. ультразвуковые ингаляции, кислородотерапию
- D. длительные паровые ингаляции

962. ДЛЯ РЕСПИРАТОРНОГО МИКОПЛАЗМОЗА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, КРОМЕ:

- A. навязчивого малопродуктивного кашля
- B. умеренно выраженной интоксикации
- C. лимфоаденопатии
- D. длительной высокой лихорадки

963. ПРИМЕСЬ КРОВИ В КАЛЕ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КРОМЕ:

- A. неспецифического язвенного колита
- B. болезни Крона
- C. полипоза кишки
- D. инвагинации кишечника

964. ТЯЖЕСТЬ САЛЬМОНЕЛЕЗА ОПРЕДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СИНДРОМЫ, КРОМЕ:

- A. интоксикации
- B. нарушений водно-солевого обмена
- C. гемодинамических расстройств
- D. повторного выделения возбудителя

965. ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ САЛЬМОНЕЛЕЗА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ:

- A. антибактериальные препараты
- B. инфузионные средства
- C. иммуноглобулины
- D. бактериофаги

966. ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРСИСТЕНЦИЕЙ ВИРУСА СОПРОВОЖДАЮТСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ, КРОМЕ:

- A. вирусного гепатита А
- B. вирусного гепатита В
- C. вирусного гепатита С
- D. вирусного гепатита D

967. ГЕПАТИТНАЯ ФОРМА ИЕРСИНИОЗА И ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, КРОМЕ:

- A. преимущественной регистрацией у детей раннего возраста
- B. токсикоза с фебрилитетом, сохраняющихся при появлении желтухи

- C. умеренного увеличения печени, болей в правой половине живота
- D. незначительных отклонений "печеночных проб", нейтрофильного лейкоцитоза в гемограмме

968. ПРИЗНАКАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ЗАПОДОЗРИТЬ ВРОЖДЕННУЮ ЦМВ-ИНФЕКЦИЮ, ЯВЛЯЮТСЯ:

- A. отклонения в состоянии ребенка с момента рождения
- B. сочетание неврологических симптомов с гепатоспленомегалией и затяжной пневмонией
- C. волнообразный затяжной характер заболевания
- D. наличие атипичных мононуклеаров в периферической крови

969. ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ВАКЦИНОЙ БЦЖ ВОЗМОЖНЫ ВСЕ НАЗВАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, КРОМЕ:

- A. регионарных лимфаденитов с абсцедированием
- B. келоидных рубцов на месте прививки
- C. генерализованной БЦЖ- инфекции
- D. анафилактического шока

970. ЭКСТРЕННАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА ПРОВОДИТСЯ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КРОМЕ:

- A. кори
- B. менингококковой инфекции
- C. эпидемического паротита
- D. вирусного гепатита А

971. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ САЛЬМОНЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ С:

- A. синдромом нарушенного кишечного всасывания
- B. эшерихиозом
- C. инвагинацией
- D. всем перечисленным

972. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПРИОБРЕТЕННОЙ ЦМВ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. интерстициальной пневмонии
- B. сиалоаденита
- C. гепатита
- D. артрита

973. ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ ЧАЩЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ:

- A. у детей до 6 месяцев
- B. у детей раннего возраста
- C. у детей от 4 до 10 лет
- D. у детей пубертатного возраста

974. ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ, КРОМЕ:

- A. инфекционно-токсического шока
- B. кишечного кровотечения
- C. выпадения прямой кишки
- D. ОПН

975. БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ ИЕРСИНИОЗЕ И ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗЕ У ДЕТЕЙ МОГУТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЧИНАМИ, КРОМЕ:

- A. илеита
- B. мезаденита
- C. проктосигмоидита
- D. аппендицита

976. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ МЕНИНГИТА ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ:

- A. лихорадки
- B. головной боли и повторной рвоты
- C. периферических парезов и параличей
- D. менингеальных симптомов

977. ПРИ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ ВОЗМОЖНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОРГАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ, КРОМЕ:

- A. орхита
- B. панкреатита
- C. серозного менингита
- D. мастита

978. ДЛЯ КАКОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ВОДЯНИСТОЙ ИЛИ "СЕКРЕТОРНОЙ" ДИАРЕИ:

- A. дизентерия
- B. кампилобактериоз
- C. ротавирусная инфекция
- D. иерсениоз

979. ДЛЯ КАКОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНА ЭКЗАНТЕМА:

- A. эшерихиозы
- B. иерсениоз
- C. сальмонеллез
- D. дизентерия

980. С КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЛЕДУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ЭШЕРИХИОЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:

- A. ОРВИ
- B. острый аппендицит
- C. дизентерия
- D. стафилококковый энтероколит

981. С КАКИМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА:

- A. ротавирусная инфекция
- B. цитробактериоз
- C. эшерихиоз (ЭТЭ)
- D. шигеллез

982. ВОЗБУДИТЕЛЬ КАКОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ К ВЫРАБОТКЕ ЭНТЕРОТОКСИНА?

- A. листериоз
- B. криптоспоридаз

- C. эшерихиоз
- D. кампилобактериоз

983. К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ОТНОСЯТСЯ:

- A. скрининг осмотры
- B. периодические
- C. предварительные
- D. все перечисленное верно

984. К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ОТНОСЯТСЯ:

- A. показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности
- B. исходы лечения
- C. показатели первичного выхода на инвалидность
- D. все перечисленное верно

985. ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ:

- A. принцип участковости
- B. принцип единого педиатра
- C. принцип диспансерного наблюдения
- D. принцип этапности в лечении

986. СРОК ИЗОЛЯЦИИ БОЛЬНОГО С ПРИОБРЕТЕННОЙ КРАСНУХОЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ _____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЭЛЕМЕНТА СЫПИ:

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

987. БОЛЬНОЙ КОРЬЮ ПОДЛЕЖИТ ИЗОЛЯЦИИ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ _____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЭЛЕМЕНТА СЫПИ:

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

988.. БОЛЬНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРОТИТОМ ПОДЛЕЖИТ ИЗОЛЯЦИИ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ _____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ЛИХОРАДКИ, УВЕЛИЧЕНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ИЛИ ДРУГИХ):

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

989. ЛИЦ, КОНТАКТНЫХ С БОЛЬНЫМ ЧУМОЙ, НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ НА _____ ДНЕЙ

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 14

990. ПАЦИЕНТ, ПЕРЕНЕСШИЙ БОТУЛИЗМ, ПОДЛЕЖИТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ У:

- A. врача-травматолога
- B. врача-гематолога
- C. врача-невролога
- D. врача-нефролога

991. ФИЗИОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ МЕСТО В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ:

- A. гриппом
- B. дизентерией Зонне
- C. хроническим бруцеллезом
- D. бешенством

992. ЛЕЧЕБНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ НАЗНАЧАЮТ:

- A. в период обострения
- B. в период стихания обострения
- C. после полного выздоровления
- D. в любой период

993. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛФК ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. острая дыхательная недостаточность
- B. сухой кашель
- C. влажный кашель
- D. легкая слабость

994. К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕ ОТНОСИТСЯ:

- A. раннее начало
- B. системность и этапность
- C. партнерство врача и больного
- D. государственность

995. К МЕРОПРИЯТИЯМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ:

- A. профилактика осложнений и обострений заболеваний
- B. лечение заболеваний в острой стадии
- C. иммунопрофилактика
- D. экстренное хирургическое вмешательство

996. В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАНОСА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТАЦИОНАР ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ:

- A. наличие боксированного приемного покоя
- B. учет сведений о контактах с инфекционными больными
- C. проведение регулярных медицинских осмотров персонала
- D. все перечисленное верно

997. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ ОТНОСИТСЯ:

- A. чума
- B. желтая лихорадка
- C. холера
- D. все перечисленное

998. ДОНОР КРОВИ ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА:

- A. дифтерию
- B. сыпной тиф
- C. вирусный гепатит
- D. брюшной тиф

999. ОДНОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

- A. подвергнуть дезинфекции и утилизации
- B. поместить в герметично закрытый контейнер
- C. сдать по счету старшей медсестре
- D. сдать по счету в ЦСО

1000. ВНОВЬ ПОСТУПИВШЕГО ПАЦИЕНТА С РЕЖИМОМ ОТДЕЛЕНИЯ ЗНАКОМИТ:

- A. заведующий отделением
- B. лечащий врач
- C. главная медсестра
- D. палатная медсестра

1001. СРОК НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОСОБО ОПАСНЫМ:

- A. немедленно
- B. 6 часов
- C. 24 часа
- D. 7 суток

1002. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ОХРАНЫ И УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:

- A. увеличение и улучшение стационарной помощи
- B. усиление профилактического направления медицины
- C. улучшение психологической помощи населению
- D. развитие профессионального спорта

1003. ПО ПРОФИЛЮ БОЛЬНИЦЫ ДЕЛЯТСЯ НА:

- A. многопрофильные
- B. стационары диспансеров
- C. специализированные
- D. все перечисленное верно

1004. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ПРИВОДИТ К:

- A. максимально гибкий график работы в соответствии с пожеланиями пациентов
- B. приближение объема и структуры оказываемой помощи к условиям круглосуточного стационара
- C. преимущественное использование методов восстановительного лечения, медицинской реабилитации больных
- D. сокращение сроков пребывания на койках круглосуточного содержания

1005. БОКСЫ МЕЛЬЦЕРА-СОКОЛОВА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КРОМЕ:

- A. предбоксик
- B. санитарный узел
- C. палату

D. шлюз для медицинского персонала

1006. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. акушерские причины
- B. инфекционные заболевания
- C. новообразования
- D. болезни органов дыхания

1007. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ (ИЛИ БОЛЕЗНЕННОСТЬ) НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

- A. выявленных по данным о причинах смерти
- B. выявленных при медицинском осмотре
- C. выявленных впервые в данном году и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых больной вновь обратился за медицинской помощью в этом году
- D. все перечисленное верно

1008. ЕДИНИЦЕЙ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. посещение больным ЛПУ
- B. первичное обращение по поводу данного заболевания в данном году
- C. заболевание, выявленное при медицинском осмотре
- D. больной, обратившийся по поводу заболевания

1009. ОСНОВНЫМ УЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТОМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. медицинская карта амбулаторного больного
- B. контрольная карта диспансерного наблюдения
- C. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом остром, профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
- D. карта эпидемиологического обследования

1010. ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. карта амбулаторного больного
- B. контрольная карта диспансерного наблюдения
- C. статистическая карта выбывшего из стационара
- D. карта эпидемиологического обследования

1011. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ – ЭТО:

- A. перечень наименований болезней
- B. перечень диагнозов
- C. перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний
- D. система группировки болезней и патологических состояний

1012. ОСНОВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗОЙ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ШИРОКИЙ КРУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ:

- A. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
- B. Концепция развития здравоохранения до 2020 года
- C. ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- D. Государственная программа развития здравоохранения Российской Федерации

Критерии оценивания тестовых заданий:

«Отлично» - количество положительных ответов 91% и более максимального балла теста.

«Хорошо» - количество положительных ответов от 81% до 90% максимального балла теста.

«Удовлетворительно» - количество положительных ответов от 71% до 80% максимального балла теста.

«Неудовлетворительно» - количество положительных ответов менее 71% максимального балла теста.

НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

1. В
2. С
3. А
4. В
5. А
6. В
7. D
8. D
9. С
10. В
11. С
12. А
13. В
14. С
15. D
16. С
17. А
18. А
19. А
20. В
21. В
22. В
23. А
24. А
25. D
26. В
27. В
28. Е
29. А
30. А
31. А
32. В
33. В
34. С
35. С
36. С
37. А
38. А
39. В

- 40. B
- 41. C
- 42. D
- 43. C
- 44. A
- 46. B
- 47. A
- 48. C
- 49. B
- 50. B
- 51. A
- 52. A
- 53. A
- 54. A
- 55. C
- 56. C
- 57. C
- 58. D
- 59. C
- 60. C
- 61. A
- 62. B
- 63. C
- 64. B
- 65. C
- 66. D
- 67. C
- 68. D
- 69. B
- 70. B
- 71. A
- 72. C
- 73. B
- 74. D
- 75. A.
- 76. A
- 77. D
- 78. B
- 79. D
- 80. B
- 81. B
- 82. A
- 83. C
- 84. B
- 85. C
- 86. A
- 87. D
- 88. C
- 89. B
- 90. D
- 91. D
- 92. B

93. D
94. C
95. B
96. B
97. C
98. B
99. B
100. D
101. B
102. A
103. C
104. A
105. C
106. D
107. C
108. A
109. B
110. B
111. C
112. C
113. B
114. B
115. B
116. A
117. C
118. A
119. B
120. A
121. D
122. C
123. A
124. B
125. A
126. D
127. A
128. A
129. D
130. C
131. A
132. B
133. B
134. A
135. D
136. A
137. D
138. B
139. D
140. C
141. A
142. B
143. B
144. C

145. C
146. D
147. C
148. A.
149. C
150. D
151. C
152. B
153. D
154. A
155. B
156. B
157. B
158. D
159. A
160. D
161. A
162. B
163. B
164. C
165. A
166. A
167. B
168. D
169. C
170. D
171. B
172. A
173. B
174. B
175. A
176. B
177. D
178. B
179. D
180. B
181. B
182. C
183. A
184. A
185. C
186. B
187. C
188. B
189. B
190. C
191. C
192. C
193. A
194. B
195. B
196. C

197. C
198. A
199. A
200. D

201. C 301. A
202. D 302. D
203. D 303. D
204. C 304. D
205. D 305. A
206. D 306. D
207. D 307. A
208. D 308. A
209. D 309. B
210. D 310. D
211. D 311. B
212. D 312. B
213. A 313. C
214. D 314. B
215. B 315. C
216. D 316. A
217. D 317. A
218. D 318. B
219. D 319. B
220. D 320. B
221. D 321. B
222. D 322. C
223. D 323. B
224. A 324. A
225. A 325. B
226. D 326. A
227. D 327. A
228. A 328. A
229. D 329. B
230. D 330. B
231. D 331. A
232. A 332. A
233. A 333. A
234. D 334. B
235. D 335. C
236. A 336. D
237. D 337. C
238. C 338. C
239. A 339. D
240. D 340. A
241. D 341. A
242. D 342. A
243. A 343. A
244. D 344. A
245. D 345. A
246. C 346. A
247. D 347. A

248. D 348. A
249. A 349. A
250. D 350. B
251. D 351. D
252. D 352. A
253. D 353. A
254. D 354. A
255. D 355. B
256. D 356. A
257. B 357. C
258. A 358. B
259. D 359. B
260. D 360. C
261. C 361. C
262. A 362. C
263. C 363. C
264. D 364. C
265. D 365. B
266. D 366. B
267. D 367. B
268. D 368. B
269. C 369. B
270. A 370. A
271. A 371. C
272. D 372. B
273. D 373. A
274. D 374. A
275. D 375. B
276. D 376. A
277. D 377. A
278. A 378. A
279. B 379. A
280. D 380. D
281. C 381. C
282. B 382. B
283. B 383. C
284. C 384. A
285. D 385. C
286. D 386. A
287. B 387. A
288. A 388. B
289. D 389. A
290. D 390. A
291. B 391. C
292. C 392. B
293. A 393. A
294. A 394. B
295. D 395. B
296. B 396. A
297. C 397. D
298. B 398. B
299. D 399. B

300. D 400. A

401	C	421	D	440	D								
402	A	422	D	441	D								
403	B	423	A										
404	D	424	C										
405	D												
406	B	425	B										
407	C	426	A										
408	D	427	C										
409	A	428	A										
410	C	429	B										
411	B	430	D										
412	A	431	A										
413	A	432	D										
414	D	433	B										
415	A	434	D										
416	C	435	A										
417	A	436	D										
418	B	437	D										
419	D	438	B										
420	D	439	D										
442	B	454	C										
443	C	455	D										
444	B	456	D										
445	D	457	A										
446	A	458	D										
447	D	459	C										
448	D	460	C										
449	A	461	D										
450	D												
451	A												
452	D												
453	D												
462	D												
463	A												
464	C												
465	D												
466	C												
467	C												
468	A												
469	B												
470	C												
471	C												
472	B												
473	B												
474	D												
475	D												
476	B	481	A	486	A	491	B	496	A	501	A	506	B
477	A	482	B	487	C	492	C	497	A	502	A	507	A

478	A	483	B	488	A	493	B	498	A	503	D	508	C
479	C	484	B	489	C	494	B	499	A	504	C	509	A
480	A	485	C	490	A	495	C	500	C	505	C	510	C
511	C	516	C	521	A	526	B	531	C	536	D	541	B
512	D	517	D	522	D	527	C	532	C	537	D	542	A
513	D	518	D	523	A	528	C	533	C	538	A	543	C
514	A	519	D	524	B	529	A	534	D	539	A	544	A
515	D	520	D	525	C	530	B	535	D	540	A	545	B
546	B												
547	A												
548	A												
549	D												
550	C												
551	B												
552	D												
553	C												
554	A												
555	C												
556	B												
557	D												
558	B												
559	A												
560	561	562	563	564	565	566							
B	D	C	D	C	C	D							
567	568	569	570	571	572	573							
B	C	B	B	D	B	B							
574	575	576	577	578	579								
D	A	C	D	D	A								
580	581	582	583	584	585								
B	B	A	C	B	B								
586	B												
587	D												
588	A												
589	D												
590	C												
591	B												
592	C												
593	D												
594	D												
595	B												
596	D												
597	C												
598	599	600	601	602	603								
B	A	B	A	D	A								
604	605	606	607	608	609								
A	D	D	D	B	A								
610	B												
611	D												
612	C												
613	A												
614	B												

615 B
 616 C
 617 D
 618 D
 619 A
 620 B
 621 D
 622 A
 634 635 636 637 638
 C C D D D
 639 640 641 642 643
 D D D D C
 644 645 646 647 648
 B C D D D
 649 650 651 652 653
 B B C A B
 654 655 656 657 658
 B A C D D
 659 660 661 662 663
 D D B D A
 664 665 666 667 668
 D D A A A
 669 670 671 672 673
 A B A D D
 674 675 676 677 678
 D A D C D
 679
 D
 680. A 691.C
 681.D 692.B
 682.B 693.D
 683.D 694.A
 684.C 695.B
 685.D 696.A
 686.D 697.A
 687.A 698.B
 688.C 699.D
 689.C 700.B
 690.C
 701. C 801. A 901. A
 702. D 802. D 902. A
 703. D 803. D 903. A
 704. C 804. D 904. A
 705. D 805. A 905. D
 706. D 806. D 906. B
 707. D 807. A 907. D
 708. D 808. A 908. D
 709. D 809. B 909. B
 710. D 810. D 910. B
 711. D 811. B 911. B
 712. D 812. B 912. C
 713. A 813. C 913. C

714. D 814. B 914. B
715. B 815. C 915. C
716. D 816. A 916. C
717. D 817. A 917. D
718. D 818. B 918. A
719. D 819. B 919. C
720. D 820. B 920. B
721. D 821. B 921. D
722. D 822. C 922. B
723. D 823. B 923. B
724. A 824. A 924. C
725. A 825. B 925. D
726. D 826. A 926. D
727. D 827. A 927. D
728. A 828. A 928. C
729. D 829. B 929. B
730. D 830. B 930. B
731. D 831. A 931. D
732. A 832. A 932. A
733. A 833. A 933. B
734. D 834. B 934. C
735. D 835. C 935. D
736. A 836. D 936. D
737. D 837. C 937. D
738. C 838. C 938. C
739. A 839. D 939. D
740. D 840. A 940. A
741. D 841. A 941. B
742. D 842. A 942. B
743. A 843. A 943. B
744. D 844. A 944. A
745. D 845. A 945. D
746. C 846. A 946. C
747. D 847. A 947. D
748. D 848. A 948. C
749. A 849. A 949. B
750. D 850. B 950. D
751. D 851. D 951. D
752. D 852. A 952. D
753. D 853. A 953. B
754. D 854. A 954. D
755. D 855. B 955. D
756. D 856. A 956. A
757. B 857. C 957. B
758. A 858. B 958. D
759. D 859. B 959. A
760. D 860. C 960. D
761. C 861. C 961. D
762. A 862. C 962. D
763. C 863. C 963. A
764. D 864. C 964. D
765. D 865. B 965. D

766.D 866. B 966. A
767. D 867. B 967. D
768. D 868. B 968. A
769. C 869. B 969. D
770. A 870. A 970. D
771. A 871. C 971. D
772. D 872. B 972. D
773. D 873. A 973. C
774. D 874. A 974. D
775. D 875. B 975. C
776. D 876. A 976. C
777. D 877. A 977. D
778. A 878. A 978. C
779. B 879. A 979. B
780. D 880. D 980. D
781. C 881. C 981. D
782. B 882. B 982. B
783. B 883. C 983. D
784. C 884. A 984. D
785. D 885. C 985. C
786. D 886. A 986. C
787. B 887. A 987. B
788. A 888. B 988. D
789. D 889. A 989. B
790. D 890. A 990. C
791. B 891. C 991. C
792. C 892. B 992. B
793. A 893. A 993. A
794. A 894. B 994. D
795. D 895. B 995. A
796. B 896. A 996. D
797. C 897. D 997. D
798. B 898. B 998. C
799. D 899. B 999. A
800. D 900. A 1000. D

1001. D
1002. B
1003. D
1004. D
1005. D
1006. A
1007. C
1008. B
1009. C
1010. C
1011. D
2012. A

Вопросы для устного собеседования

1. Клинические и эпидемиологические показания для госпитализации инфекционных больных.
2. Острая дыхательная недостаточность. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение.
3. Острая сердечная недостаточность. Понятие. Острая левожелудочковая, острая правожелудочковая, тотальная сердечная недостаточность. Принципы терапии.
4. Острая почечная недостаточность. Преренальная, ренальная, постренальная. Клиника. Диагностика. Лечение.
5. Кома. Клиника. Диагноз. Общие принципы лечения и ухода. Печеночная кома, гипоксическая, диабетическая комы.
6. Шок. Понятие. Виды шоков (геморрагический, кардиогенный, анафилактический, инфекционно-токсический). Принципы терапии разных видов шоков.
7. Основные принципы комплексного лечения инфекционных больных.
8. Значение режима, ухода и диетотерапии.
9. Осложнения, связанные с лечением. Токсико-аллергические реакции. Сывороточная болезнь. Дисбактериоз
10. Специфическая профилактика инфекционных болезней. Национальный календарь прививок. Нормальные и патологические реакции на прививки.
11. Средства для создания пассивного иммунитета. Показания и противопоказания к их применению, способы введения в организм. Осложнения.
12. Методы этиологической диагностики инфекционных болезней, их клиническая интерпретация.
13. Воздействие на возбудителей бактериальных болезней и их токсины. Антибиотики. Сульфаниламиды. Нитрофурановые препараты. Хинолоны. Другие химиопрепараты.
14. Резистентность возбудителей к химиопрепаратам. Фаги. Сыоротки. Гаммаглобулины.
15. Противовирусные препараты. Интерфероны. Принципы этиотропной терапии вирусных инфекций.
16. Дезинтоксикационная терапия. Сорбционная терапия. Понятие о гемо- и энтеросорбции. Их виды и области применения.
17. Иммунотерапия. Показания и противопоказания к ее применению. Средства неспецифической стимуляции организма.
18. Регидратационная терапия. Сущность. Показания и схемы парентеральной и оральной регидратации. Особенности инфузионной терапии детей раннего возраста.
19. Плазмоферез. Гипербарическая оксигенация. Лазеротерапия.
20. Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами инфекционных заболеваний.

Алгоритмы практических навыков

1. Алгоритм взятия мазков из зева и носа, смывов из носоглотки.
2. Алгоритм отбора материалов для бактериологического исследования (посев крови, посев мочи, посев испражнений, посев желчи, посев промывных вод желудка).
3. Алгоритм внутривенной пункции для отбора крови для серологического исследования.
4. Алгоритм отбора мокроты на бактериоскопическое и вирусологическое исследование.

5. Алгоритм оценки состояния слизистых полости рта, небных миндалин, задней стенки глотки с интерпретацией.
6. Алгоритм оценки характера высыпаний на коже (локализация, распространенность, морфология элементов, этапность, разрешение).
7. Глубокая методическая топографическая скользящая пальпация органов брюшной полости по Образцову-Стражеско.
8. Интерпретация показателей клинического и биохимического анализа крови.
9. Методика определения менингеальных симптомов. Интерпретация показателей ликвора.
10. Алгоритм выполнения ректального исследования и ректороманоскопии.
11. Алгоритм выполнения спинномозговой пункции.
12. Алгоритм промывания желудка.
13. Приготовление тонкого мазка и толстой капли крови при малярии.
14. Алгоритм констатации клинической смерти.
15. Алгоритм определения вероятных и достоверных признаков биологической смерти.
16. Определение патологического типа дыхания (Куссмауля, Чейнна-Стокса, Биота).
17. Определение наличия жидкости в брюшной полости методом перкуссии и баллотации.
18. Интерпретация показателей коагулограммы.
19. Алгоритм определения суточного диуреза и его оценка.
20. Интерпретация показателей анализа мокроты и плевральной жидкости.
21. Алгоритм определения группы крови стандартными гемагглютинирующими сыворотками.

Задачи

ЗАДАЧА 1.

В приемный покой поступил мальчик 6 лет с жалобами на головокружение, на повышение температуры тела до 38,5 °С, беспокойство, жидкий стул и судороги. Из анамнеза известно, что на 6-й день после прививки (ревакцинации против кори, эпидемического паротита, краснухи) отмечали подъем температуры до 38 °С, на следующий день после чего появились элементы распространенной везикулярной сыпи на волосистой части головы, туловище и конечностях. Выставлен диагноз ветряной оспы. Назначен Ацикловир в дозе 400 мг х 3 раза в день. В течение 3-х дней элементы подсыпали, появились на слизистой полости рта. С 4 дня - нормализация температуры тела, отсутствие новых элементов сыпи. На 7-й день болезни (14-й день поствакцинального периода) утром при пробуждении и попытке встать с кровати упал и в течение дня жаловался на головокружение. На 8-й день жалобы сохранялись и, ребенок на 15-й день поствакцинального периода, 9-й день заболевания был госпитализирован. Эпидемиологический и семейный анамнез не отягощен.

- Вопросы:**
1. Какой диагноз можно предположить?
 2. Не является ли данное заболевание осложнением на прививку?
 3. Какое исследование позволит подтвердить диагноз?

Ответ: 1. Ветряная оспа. Энцефалит, церебеллярная форма

2. Нет.

3. Молекулярно-биологическое исследование крови и ликвора на ДНК *H.zoster*, а также серологическое исследование крови методом ИФА на IgM к *H.zoster*

ЗАДАЧА 2.

У ребенка 1,5 лет накануне обращения к врачу повысилась температура тела до 38,5⁰С. В день обращения кожные высыпания лихорадит до 37,9⁰С и отмечено появление сыпи на лице, волосистой части головы. На момент осмотра состояние и самочувствие удовлетворительное. Катаральных явлений нет. На волосистой части головы лице, за ушами, на шее, спине элементы полиморфной сыпи (пятна, папулы, единичные везикулы). Слизистые оболочки влажные, единичные афты на языке и небных дужках. Небные миндалины 1 ст, без налета. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное, без хрипов. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не пальпируются. Стул и диурез без нарушений. Менингеальной и очаговой симптоматики нет.

Вопросы: 1. Какой клинический диагноз можно поставить ребенку?

2. Какие наиболее частые специфические осложнения ветряной оспы?

3. Возможна ли специфическая профилактика ветряной оспы?

Ответ:

1. Ветряная оспа.

2. Ветряночный энцефалит (церебеллит), острый стенозирующий ларинготрахеит

3. Живые вакцины Окавакс (Франция) и вакцина Варилрикс (Бельгия).

ЗАДАЧА 3.

У ребенка 7 лет повысилась температура тела, появились боли в горле, заложенность носа. На шее увеличились лимфоузлы. Заболел 5 дней назад с повышением температуры тела до фебрильных цифр, болей в горле. В последующие дни температура тела сохранялась до 39,0-38,5⁰С, боли в горле, появилась заложенность носа, со скудным отделяемым. Гнусавость голоса. Вчера заметили увеличенные лимфоузлы на шее. Отмечается пастозность лица и век. Мальчик дышит открытым ртом, губы сухие потрескавшиеся, храпит во время сна.

При осмотре в приемном покое стационара отмечается гипертрофия небных миндалин до 2-3 степени, их гиперемия, выпотом в лакунах, по задней стенке глотки – густая желтоватая слизь. Визуализируются шейные лимфоузлы: переднешейные «пакетами» до 2,0х3,0 см, плотные, подвижные, умеренно болезненные, заднешейные – до 1,0 см, множественные, подвижные, безболезненные. Тоны сердца ясные, ритмичные, тахикардия. Дыхание в легких жесткое, без хрипов. Живот мягкий, безболезненный, доступен глубокой пальпации. Печень выступает на 2 см из-под края реберной дуги, край гладкий, эластичный, безболезненный, селезенка пальпируется на 1,5 см ниже реберной дуги. Стул и диурез без нарушений. Менингеальной и очаговой симптоматики нет.

Результаты клинического анализа крови при поступлении представлены в таблице.

Показатели	Норма	Результат
Гемоглобин	110-145 г/л	125 г/л
Эритроциты	3,5-4,7х 10 ¹² /л	4,1 х10 ¹² /л
Тромбоциты	160-380 х ⁹ /л	180х10 ⁹ /л
Лейкоциты	4,5-10 х 10 ⁹ /л	19,8х 10 ⁹ /л

Палочкоядерные	0,0-5 %	9%
Сегментноядерные	35-65%	28%
Эозинофилы	0,0-5%	0%
Базофилы	0-1%	0%
Лимфоциты	24-54%	42%
Моноциты	2-10%	13%
Атипичные мононуклеары	0%	8%
СОЭ	4-12 мм/час	28 мм/час

- Вопросы:** 1. Какой клинический диагноз можно поставить ребенку?
2. Какие лабораторные методы диагностики надо применить?
3. Какие изменения в гемограмме характерны в остром периоде инфекционного мононуклеоза?

Ответ:

1. Инфекционный мононуклеоз
2. Серологическое обследование крови (IgM, IgG) к герпесвирусам (ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ бтипа), а также полимеразную цепную реакцию на ДНК герпесвирусов в сыворотке крови.
3. Лейкоцитоз, лимфоцитоз, атипичные мононуклеары, возможны тромбоцитопения, увеличенная СОЭ.

ЗАДАЧА 4.

В январе в приемный покой стационара поступил ребенок 8 лет с жалобами на повышение температуры тела до 39,5⁰ С, вялость, слабость, головную боль, ломоту в мышцах, боль в горле, сухой кашель. Ребенок болен 3-й день. Заболел остро, отмечалась головная боль, ломота в мышцах, болезненность при движении глазных яблок, подъем температуры до 38,9⁰С, озноб. На второй день появились грубый надсадный кашель с болью за грудиной, першение в горле, умеренное затруднение носового дыхания. Эпидемиологический анамнез: посещает школу 2 класс, карантина нет, но в классе есть дети с кашлем и насморком, 5 детей больны и не посещают школу. В семье все здоровы. Мальчик болеет ОРВИ 3-4 раза в год, дважды переносил обструктивный бронхит, однократно - г/энтерит неясной этиологии, в 5 лет – ветряную оспу. Аллергоанамнез: пищевая аллергия на рыбу. При осмотре в приемном покое состояние средней тяжести. Вес 24 кг. Рост 128 см. Температура тела 38,4⁰С. Кашель грубый, сухой, непродуктивный. Скудные серозные выделения из носа, инъекция сосудов склер. Периферические лимфоузлы не увеличены. Яркая гиперемия и зернистость задней стенки глотки, инъекция сосудов слизистой оболочки зева. Тоны сердца звучные, ритмичные, ЧСС - 100/мин. В легких жесткое дыхание, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД-22/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Очаговой и менингеальной симптоматики нет. Стул оформлен. Мочиспускание свободное, безболезненное. Мочился 1 час назад. В приемном покое сатурация крови кислородом – 97%. Данные клинического анализа крови, выполненные при поступлении в стационар, представлены в таблице.

Показатель	min	max	Результат	Ед.
------------	-----	-----	-----------	-----

				измерения
Гемоглобин	120	150	130	г/л
Эритроциты	4,1	4,5	4,3	$10^{12}/л$
Тромбоциты	200	400	290	$10^9/л$
Лейкоциты	4,5	13	3,9	$10^9/л$
Нейтрофилы			43	%
палочкоядерные	1	5	9	%
сегментоядерные	45	60	34	%
Лимфоциты	25	40	57	%
Моноциты	0	13	2	%
Базофилы	0	1	0	%
Эозинофилы	0,5	5	0	%
СОЭ	2	10	8	мм/час

Вопрос:

1. Какой клинический диагноз наиболее вероятен?
2. Какие исследования необходимо провести в стационаре для подтверждения диагноза?
3. Каким противовирусным препаратом следует проводить этиотропную терапию?

Ответ:

1. Грипп, типичная форма, средней степени тяжести, гладкое течение
2. Клинический анализ крови. В представленном анализе крови имеет место умеренно выраженная лейкопения и палочкоядерный сдвиг влево, что характерно для острой вирусной инфекции, в том числе гриппа, в первые трое суток болезни. Этиологическая диагностика – ПЦР мазков с задней стенки глотки –тест-системы: ОРВИ-СКРИН+ тест на РНК вирусов гриппа
3. Осельтамивиром или Умифеновиром, возможно назначение индукторов интерферонов.

ЗАДАЧА 5.

В приемном покое стационара осмотрен мальчик 3,5 лет с жалобами на повышение температуры, головную боль, рвоту, боли в животе, жидкий водянистый стул. Указаний на употребление инфицированных (или потенциально инфицированных) пищевых продуктов, воды за 12-72 часа до начала заболевания – нет; в семье старший ребенок находится на стационарном лечении по поводу гастроэнтерита. Ребенок болен вторые сутки, заболел остро, повысилась температура до $37,8^{\circ}\text{C}$, появились: головная боль, рвота 5 раз, боли в животе, жидкий водянистый стул до 7 раз; дома принимал смекту, регидрон.

На вторые сутки сохраняется субфебрильная лихорадка $37,6 - 37,8^{\circ}\text{C}$, непостоянные боли в животе, жидкий водянистый пенистый стул желтого цвета без патологических примесей (5 раз/сут), мочеиспускание не нарушено. Заболевание протекает на отягощенном преморбидном фоне: дискинезия желчевыводящих путей; атопический дерматит; пищевая сенсibilизация неуточненная. При поступлении в стационар лихорадка $38,0^{\circ}\text{C}$. Аппетит снижен, пьет охотно, жалуется на головную боль. Кожные покровы обычной окраски, на голенях и ягодицах незначительно выраженные проявления атопического дерматита, подкожно-жировой слой развит удовлетворительно, тургор и эластичность кожи сохранены

Глазные яблоки не запавшие, тургор в норме. Видимые слизистые обычной окраски, влажные, слезоотделение в норме, язык влажный, обложен белым налетом. Пульс удовлетворительного

наполнения и напряжения, ЧСС – 116, тоны сердца звучные, ритмичные. ЧД – 26 в мин, дыхание проводится во все отделы, везикулярное, хрипов нет. Живот правильной формы, равномерно участвует в акте дыхания, незначительно вздут, при пальпации отмечается разлитая болезненность по ходу кишечника, урчание, сигмовидная кишка не спазмирована, синдромы раздражения брюшины – отрицательные. Печень, селезенка не увеличены. Мочеиспускание не нарушено, последний раз мочился 2 часа назад.

Очаговой и менингеальной симптоматики нет.

Вопрос:

1. Какие лабораторные исследования необходимо сделать пациенту?
2. Какому инфекционному заболеванию соответствует клиническая картина?
3. Существует ли специфическая профилактика этой инфекции?

Ответ:

1. Клинический анализ крови; бактериологическое исследование кала на возбудители дизентерии, тифопаратифозные микроорганизмы, сальмонеллы, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, кампилобактерии; ПЦР кала на РНК рота- и норовирусов, при возможности других кишечных вирусов (ОКИ-СКРИН); копрограмму.

2. Ротавирусному гастроэнтериту.

3. Вакцина Ротатек- пентавалентная живая оральная вакцина для профилактики ротавирусной инфекции вводится трехкратно после 6 недель с интервалом 4-10 недель

ЗАДАЧА 6.

Ребенок 5 лет осмотрен врачом на дому в связи с повышением температуры до 38,0⁰С, схваткообразные боли внизу живота, тенезмы, частый скудный стул со слизью и прожилками крови (до 5 раз в сут). Ребенок болен вторые сутки, заболел остро, повысилась температура до 38,5⁰С, появились головная боль, однократная рвота, схваткообразные боли внизу живота, жидкий стул с примесью слизи и прожилками крови. На второй день заболевания: лихорадит субфебрильно до 37,9⁰С, слабые, непостоянные боли внизу живота, появились болезненные ложные позывы на дефекацию, стул скудный со слизью и прожилками крови, до 5 раз/сут. Преморбидный фон отягощен наличием атопического дерматита и неуточненной пищевой сенсibilизации. Из эпид. анамнеза: ребенок посещает детское учреждение, в котором зарегистрировано несколько случаев заболевания кишечными инфекциями. При осмотре сохраняется субфебрильная лихорадка до 38,0⁰С. Кожные покровы обычной окраски, на голенях и ягодицах незначительно выраженные проявления атопического дерматита, подкожно-жировой слой развит удовлетворительно, тургор кожи сохранен. Глазные яблоки не запавшие. Видимые слизистые обычной окраски, влажные, слезоотделение в норме, язык влажный, обложен белым налетом. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ЧСС – 114, тоны сердца звучные, ритмичные. ЧД – 26 в мин, дыхание проводится во все отделы, везикулярное, хрипов нет. Живот втянут, болезненный в левой подвздошной области. Сигмовидная кишка спазмирована, болезненная. Анус податлив, симптомы раздражения брюшины – отрицательные. Печень, селезенка не увеличены. Стул скудный, с большим количеством мутной слизи и прожилками крови. Мочеиспускание не нарушено. Очаговой и менингеальной симптоматики нет.

Вопрос:

1. Какой клинический диагноз можно поставить ребенку?
2. Какие лабораторные исследования необходимо сделать пациенту?
3. Какова тактика ведения пациента?

Ответ:

1. Клиническая дизентерия, острое течение, легкой степени тяжести.
2. Клинический анализ крови, копрограмма, бактериологическое исследование кала на возбудители дизентерии, тифопаратифозные микроорганизмы, сальмонеллы, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, кампилобактерии и определение чувствительности к антибиотикам и фагам.
3. Лечение в амбулаторных условиях: диета, оральная регидратация, патогенетические средства (сорбенты, пробиотики), этиотропные средства (антимикробные пероральные препараты, иммуноглобулины оральные), симптоматические средства (жаропонижающие, спазмолитики, кровоостанавливающие)

ЗАДАЧА 7.

В конце августа врачом на дому осмотрен подросток 16 лет, который три недели назад приехал из Самарской области, где отдыхал у родственников в сельской местности в течение 1 месяца. Заболел остро 5 дней назад с повышения температуры тела до 39,5°C с ознобом, слабости, головной боли, боли в животе и пояснице, тошноты, 4-кратной рвоты, сухости во рту и жажды. Фебрильная лихорадка сохранялась все дни на высоких цифрах (38,5-39,0°C) с периодическими ознобами. После приема Парацетамола температура снижалась на 3-4 часа, с последующим подъемом. Отмечали слабость, снижение аппетита на фоне сильной жажды, головную и мышечные боли. На 4 сутки усилились боли в верхних отделах живота и в пояснице, появилась тошнота, усилилась жажда, сухость во рту. На 5-й день болезни температура снизилась до нормы, но появилась сонливость, усилилась тошнота, не связанная с приемом пищи, 4 раза была рвота, однократно отмечали носовое кровотечение, мочеиспускания стали 3 раза в сутки. В день обращения, со слов матери, появились непроизвольные подергивания мимической мускулатуры, мышц рук. Количество выделяемой мочи с вечера не превышает 100 мл. Стул в предыдущие дни 1-2 раза в сутки, кашицеобразный. В день обращения стула не было. Состояние тяжелое, мальчик вялый, сонливый. Температура при осмотре – 36,4 °C. При осмотре обращает на себя внимание гиперемия кожи лица, шеи, инъектированность сосудов склер. На коже груди единичные петехии, во внутреннем углу правого глаза небольшое кровоизлияние. Слизистые полости рта сухие. Носовое дыхание свободное. Слизистые ротоглотки без воспалительных явлений. Тургор тканей удовлетворительный. Пульс 64 в мин, удовлетворительного наполнения и напряжения, тоны сердца слегка приглушены, выслушивается нежный систолический шум на верхушке и в точке Боткина. Дыхание проводится во все отделы, везикулярное. Пальпаторно определяется боль в эпигастрии, в правом подреберье. Живот вздут. Печень пальпируется на 1,0 см ниже края реберной дуги, положительный симптом Пастернацкого. Селезенка на 1,5 см выступает из-под края реберной дуги. Менингеальные симптомы отрицательные.

Вопрос:

1. Какой должна быть тактика врача?
2. Какой предварительный диагноз можно поставить?
3. Какие осложнения этого заболевания, угрожающие жизни, могут развиваться?

Ответ:

1. Срочная госпитализация ребенка в ОРИТ инфекционного стационара
2. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, олигурический период
3. Кровоизлияния в головной мозг и надпочечники, азотемическая уремия, шок

ЗАДАЧА 8.

Мальчик 12 лет осмотрен врачом на дому по поводу повышения температуры тела, припухлости на шее, болезненность при жевании. Заболел 4 дня назад с повышения температуры тела до 38,0⁰С, которая сохранялась в течение 4-х дней, и незначительной припухлости в области шеи слева. Врача не вызывали, лечились симптоматически. Через 2 дня появилась припухлость справа и болезненность при жевании. Аллергоanamнез отягощен: atopический дерматит до 2-х лет. Привит по индивидуальному графику из-за atopического дерматита. Проживает в отдельной квартире с родителями и еще 1 ребенком. Младший ребенок 4 лет, привит по графику, посещает детский сад, здоров. На момент осмотра температура тела 37,1⁰С. Состояние и самочувствие удовлетворительное. Катаральных явлений нет. Кожные покровы обычной окраски без инфекционной сыпи. В области шеи с двух сторон отмечается припухлость тестоватой консистенции, безболезненна, кожа слегка напряженная, обычной окраски. Ретромандибулярная ямка сглажена. Слизистые оболочки ротоглотки влажные, чистые, с двух сторон отмечается положительный симптом Мурсона. Небные миндалины гипертрофированы 1 ст, без налета.

Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное, без хрипов. ЧД=16/мин, ЧСС= 80 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не пальпируются. Стул и диурез без нарушений. Менингеальной и очаговой симптоматики нет

Вопрос:

1. Какой клинический диагноз наиболее вероятен?
2. Поражения каких органов наблюдают при эпидемическом паротите?
3. Какие осложнения /резидуальные явления/ эпидемического паротита могут быть?

Ответ:

1. Эпидемический паротит, типичная, изолированная форма, легкой степени тяжести.
2. Слюнных желез (паротит, субмандибулит, сублингвит), центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит), поджелудочной железы (панкреатит), половых желез (орхит, оофорит), слезной железы (дакриоцистит), реже другие железистые органы.

Гипертензионный синдром, ожирение, сахарный диабет, бесплодие.

ЗАДАЧА 9.

У ребенка 2,5 лет при обследовании перед плановой госпитализацией по поводу паховой грыжи выявлено повышение уровня аминотрансфераз до 1,5-2 норм. Направлен на консультацию к врачу детской поликлиники. Жалоб не предъявляет. Ребенок от матери ранее употреблявшей наркотические препараты. Во время беременности были выявлены анти-НСV, АлТ - норма, других обследований не проводилось. Диагноз у матери с ее слов «Носительство антител к гепатиту С». Мальчик от III беременности, I срочных самостоятельных родов. Масса тела при рождении 3050г, длина 50 см., к груди приложен в родильном зале. Грудное вскармливание до 3 мес. Обследован на гепатит С в 3 мес. и в 1,5 года, анти-НСV (+), АлТ 16-26 ед/л, АсТ 29-38 ед/л УЗИ брюшной полости – без патологии. Других обследований не проводилось. Наблюдался хирургом, назначено оперативное лечение паховой грыжи. При сдаче анализов для госпитализации 2 недели назад выявлено повышение АлТ до 67 ед/л, АсТ до 93 ед/л. Аллергоanamнез не отягощен. Вакцинирован по индивидуальному графику. Из перенесенных заболеваний ОРВИ в 9 мес., лечение симптоматическое. Инструментальных и парентеральных вмешательств, кроме вакцинации, не было. Проживает в отдельной квартире. Посещает детское учреждение. При осмотре в поликлинике состояние удовлетворительное, активный, аппетит не нарушен; не лихорадит, катаральный синдром отсутствует. Кожа чистая, обычной окраски, л/узлы до 0,5-0,7 мм, безболезненные, эластичные. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумы не определяются, ЧСС – 116/мин. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный, доступный глубокой пальпации; печень выступает из-под края

реберной дуги на 2,0 см, уплотнена, край ровный, селезенка не увеличена. Стул оформленный, окрашенный. Диурез достаточный, моча светлая. Менингеальные симптомы отрицательные.

Вопрос:

1. Какое инфекционное заболевание необходимо исключить?
2. Какое лабораторное и инструментальное обследование необходимо провести?
3. Какой путь заражения ребенка наиболее вероятен?

Ответ:

1. Хронический гепатит С (первично-хронический)
2. Клинический анализ крови; биохимический анализ крови; серологическое скрининговое обследование на гепатиты А, В, С; полимеразная цепная реакция крови на выявление вирусов гепатита В и С; УЗИ органов брюшной полости.
3. Перинатальный (в родах) от матери с гепатитом С к ребенку.

ЗАДАЧА 10.

05.09 ребёнок 9 лет осмотрен педиатром на дому по поводу повышения температуры тела до 38,5 °С, головной боли, тошноты, двукратной рвоты, вялости, сонливости. Болен третий день. Два дня назад появились умеренные боли в горле при глотании, температура тела поднималась до 37,8 °С. С вечера предыдущего дня отмечали повышение температуры тела до 38,5°С, беспокоила сильная головная боль, повторная рвота. На фоне приема Парацетамола температура снижалась до 37,4 °С. Аппетит снижен. Пьет до 1,5 литров в день. Стул накануне вечером однократный, кашицеобразный. Известно, что неделю назад приехали с дачи в Ленинградской области. При осмотре лихорадка до 38,9 °С. Катаральный синдром выражен слабо, преимущественно в виде умеренной гиперемии и зернистости задней стенки глотки, инъектированности и отека слизистой оболочки мягкого неба и язычка, инъекции сосудов склер. Кожа чистая, гиперемия кожных покровов лица и верхней части груди, тонзиллярные лимфатические узлы до 0,7 см в диаметре, безболезненные, эластичные. Тахикардия до 100 уд/мин, тоны сердца ясные, звучные, ритмичные. Дыхание проводится во все отделы, везикулярное. Живот безболезненный, печень, селезенка не увеличены. Положительные менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского. Выражена светобоязнь. Стул накануне был однократно, оформленный. Мочился в предыдущие сутки до 10 раз, последний раз - 1 час назад.

Вопрос:

1. Какой клинический диагноз следует поставить ребенку?
2. Какова врачебная тактика в отношении пациента?
3. Какова наиболее вероятная этиология заболевания?

Ответ:

1. Серозный менингит
2. Госпитализация в инфекционное отделение для проведения люмбальной пункции и клинико-этиологического обследования
3. Энттеровирусная

ЗАДАЧА 11.

24.07. в 9.30 вызов врача неотложной помощи к пациенту 42 лет, у которого развился судорожный приступ и отмечается нарушение дыхания. Установлено, что 20 дней назад (4.07) во время работы на стройке он проколол пятку правой стопы ржавым гвоздем. Рану обработал самостоятельно йодом, к врачу не обращался. Самочувствие в течение 2-х недель не нарушалось. 17.07. появилась слабость, головная боль, снижение аппетита, повышение температуры тела до 37,8°С и артериального давления до 160/80 мм рт.ст. С 20.04 пациент стал

отмечать болезненность в области правой пятки и небольшое жжение, 22.07 присоединилось периодическое подергивание мышц вокруг раны на правой стопе и очень кратковременные судороги икроножных мышц той же ноги. Сохранялась субфебрильная лихорадка от 37,0°C до 37,6°C. С утра 24.07 с усилением головных болей появилась сильная потливость рук и ног, а затем развились болезненное напряжение мышц лица со сжатием зубов, выраженное мышечное напряжение рук и ног, частое и затрудненное дыхание, судороги в течение 1-1,5 минуты, сопровождающиеся запрокидыванием головы назад, нарушение дыхания (спазм). Травмы, переломы, операции отрицает. Аллергологический анализ не отягощен. При осмотре состояние тяжелое, выраженное беспокойство, крик, светобоязнь. Отмечается тризм, дисфагия, тремор нижней губы, подбородка, языка, судорожное сокращение мускулатуры лица, рот растянут, напряжен. При осмотре отмечаются клонические судороги. Кожа лица гиперемирована, горячая, обильное потоотделение. Осмотр зева затруднен из-за спазма жевательной мускулатуры. Тоны сердца приглушены, тахикардия, единичные экстрасистолы. АД 160/70 мм. рт. ст. Дыхание поверхностное, частое. Дыхательные шумы не определяются. Живот напряжен, чувствителен при пальпации мышц. Печень и селезенка не увеличены. При судорогах отмечается самопроизвольное отхождение кала и мочи. Менингеальные симптомы сомнительные (определение затруднено). Местный статус: на подошвенной поверхности правой стопы в области III плюсневой кости рана 0,5x0,5 см, края неровные, отечные, резкая болезненность при пальпации, сокращение мускулатуры

Вопрос:

1. Какой клинический диагноз можно поставить?
2. Какая специфическая терапия проводится при столбняке?
3. Какую местную терапию необходимо провести?

Отчет:

1. Раневой генерализованный столбняк, тяжелое течение
2. Противостолбнячная сыворотка, специфический иммуноглобулин
3. Хирургическую обработку раны с иссечением поврежденных тканей, удалением инородных тел.

ЗАДАЧА 12.

Девочка 8 лет осмотрена педиатром на дому в связи с повышением температуры тела до 37,8°C, умеренной головной болью, покраснением правой ушной раковины и за ухом. Известно, что три недели назад, в начале мая, ездили на дачу в Ленинградскую область, где гуляли в лесу. Во время прогулки сняли с одежды клеща и выбросили его. Профилактических мероприятий не проводили. Больна 3-й день: поднялась температура тела до 38,5 °С, что сопровождалось слабостью, головной болью, першением в горле, снижением аппетита, тошнотой, болями в мышцах. На следующий день сохранялась субфебрильная температура, появились боли в шее и скованность при ее движении, увеличились задне-шейные лимфоузлы до 0,8 см, безболезненные, эластичные, заушный узел справа – до 2,5 см, умеренно болезненный. На 3-й день на фоне сохранения субфебрильной температуры появилось покраснение в области ушной раковины и за ухом. Семейный анамнез атопии отягощен: у бабушки по отцу – бронхиальная астма, у отца – полиноз; установлена аллергия на перо подушки и шерсть кошки – аллергический ринит; вакцинирован по Национальному календарю с нарушением графика, в связи с частыми респираторными заболеваниями и обострением аллергических проявлений. При осмотре ребенка установлено, что сохраняется лихорадка до 38,2°C. Катаральный синдром выражен слабо, преимущественно в виде умеренной гиперемии и зернистости задней стенки глотки. Кожа туловища и конечностей чистая, ушная раковина гиперемирована, несколько отечна; за ухом папула, вокруг которой овальной формы эритема с неровными, ярко гиперемированными краями, внутри эритемы просветление. Заушный лимфоузел увеличен до 2,5 см в диаметре, умеренно болезненный при пальпации, тонзиллярные лимфатические узлы – до 1,0 см, задне-шейные – мелкие, единичные до 0,8 см, безболезненные, эластичные. Тоны сердца чистые, звучные, ритмичные; ЧСС – 92 уд/ мин. Дыхание проводится во все отделы,

везикулярное. Живот безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Менингеальные симптомы отрицательные

Стул накануне был однократно, оформленный. Мочился за предыдущие сутки более 10 раз, последний раз - 2 часа назад.

Вопрос:

1. Какой клинический диагноз можно заподозрить?
2. Какие лабораторные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза ?
3. При отсутствии лечения и развитии хронического боррелиоза какие органы могут поражаться?

Ответ:

1. Острый клещевой боррелиоз, типичная эритемная форма средней степени тяжести, гладкое течение.
2. Клинический анализ крови; ПЦР крови для выявления ДНК боррелий; ИФА крови для выявления IgM и IgG к боррелиям.
3. Нервная система, сердце, суставы, кожа

ЗАДАЧА 13.

Мальчик 13 лет осмотрен педиатром на дому в связи с жалобами на недомогание, повышение температуры тела до 38,2⁰ С, головную боль, кашель, першение в горле. Ребенок болеет 10 дней. Температура тела 38,4 – 37,4⁰ С держится в течение всего времени заболевания. Катаральные явления нарастают постепенно: сначала першение в горле, насморк, слизистые выделения из носа, затем сухой навязчивый кашель, временами приступообразный, инъекция сосудов склер. При осмотре состояние и самочувствие ребенка удовлетворительное. Аппетит не снижен. Пьет достаточно. Температура тела 37,6⁰ С. Периферические лимфоузлы шейной группы мелкие, подвижные, безболезненные. Кожные покровы чистые, нормальной окраски, легкая гиперемия щек, инъекция сосудов склер. Нос заложен, небольшие слизистые выделения из носа. В зеве умеренная гиперемия слизистых оболочек и зернистость задней стенки глотки. Кашель сухой, навязчивый, иногда заканчивается позывами на рвоту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 86 уд. в 1 мин. Дыхание проводится во все отделы легких. Выслушиваются рассеянные сухие и единичные влажные средне-пузырчатые хрипы с обеих сторон в нижних отделах легких. Перкуторно звук с коробочным оттенком. ЧД 22 в 1 мин. Живот безболезненный. Пальпируется край печени, селезенка не увеличена. Стул 1 раз в сутки, оформленный. Диурез в норме. Менингеальных симптомов нет.

Вопрос:

1. Какие заболевания необходимо исключить?
2. Есть ли показания для госпитализации?
3. Какое лабораторное и инструментальное обследование целесообразно провести?

Ответ:

1. Микоплазменную инфекцию, в том числе микоплазменную пневмонию; коклюш на фоне сопутствующей респираторной вирусной инфекции; вирусно-бактериальную пневмонию другой этиологии.
2. Есть, т.к. необходимо обследование ребенка для исключения пневмонии
3. Клинический анализ крови, СРБ, мазки из ротоглотки на ДНК возбудителей коклюша и респираторных микоплазм и хламидофил, ИФА крови на наличие IgM и IgG к респираторным микоплазмам. При наличии лейкоцитоза, повышения уровня СРБ, СОЭ – рентгенограмма грудной клетки.

ЗАДАЧА 14.

Ребенок 5,5 лет с неотягощенным преморбидным фоном заболел остро 4 дня назад, с повышения температуры тела до 37,5°C, выделений из носа, умеренных болей в горле. Преморбидный фон не отягощен. На второй день заболевания на фоне субфебрильной лихорадки появились первые элементы сыпи на щеках, ярко-красного цвета, сливающиеся и похожие на следы от пощечин. На 3-и сутки стали появляться элементы ярко-красной пятнисто-папулезной сыпи на коже верхних и нижних конечностей, преимущественно на разгибательных поверхностях, и на ягодицах, сопровождается умеренным зудом. Ребенок посещает ДУ, в котором зарегистрировано несколько случаев заболеваний, сопровождающихся эритемой. Осмотрен педиатром на 5 сутки заболевания. При осмотре Субфебрильная лихорадка до 37,1°C. Аппетит сохранен, пьет охотно. Носовое дыхание сохранено. Кожные покровы обычной окраски, на коже лица неяркая гиперемия щек без четких границ, на коже верхних и нижних конечностей отмечается пятнистая сыпь розово-красного цвета с фестончатыми краями («кружевная» сыпь), сопровождается умеренным зудом, тургор и эластичность кожи сохранены. Видимые слизистые обычной окраски, чистые, гладкие, блестящие, влажные, язык обложен белым налетом. Пальпируются затылочные лимфоузлы до 1 см в диаметре, подвижные, безболезненные. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ЧСС – 92, тоны сердца звучные, ритмичные. ЧД – 26 в мин, дыхание проводится во все отделы, везикулярное, хрипов нет. Живот правильной формы, равномерно участвует в акте дыхания, при пальпации безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Мочепускание не нарушено, стул оформленный. Очаговой и менингеальной симптоматики нет.

Вопрос:

1. Какое лабораторное обследование целесообразно провести для верификации диагноза?
2. Между какими инфекционными заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику?
3. Какие гематологические изменения характерны для данного заболевания?

Ответ:

1. ИФА крови (определение специфических антител класса IgM, IgG) к парвовирусу В19
2. Корью, краснухой, ОРВИ с аллергической реакцией.
3. Возможно снижение гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов на фоне лимфоцитоза и нормальной СОЭ.

ЗАДАЧА 15.

Ребенок 6 лет осмотрен врачом на дому по поводу приступообразного кашля, не купирующегося симптоматической терапией, чаще в ночное время. Две недели назад на фоне нормальной температуры и хорошего общего самочувствия ребенок стал подкашливать, на второй неделе кашель усилился, участился особенно в ночное время, температура тела не повышалась. Наблюдался участковым врачом с диагнозом ОРВИ. Симптоматическая терапия без эффекта. К концу 2-й недели кашель стал приступообразным, с легким покраснением лица во время приступа, высовыванием языка, отхождением вязкой стекловидной мокроты, периодически заканчивался рвотой. Вне приступа отмечалась бледность кожных покровов, некоторая одутловатость лица. Известно, что респираторными инфекциями болеет редко, алергоанамнез отягощен: атопический дерматит, вне обострения. Вакцинирован по индивидуальному графику (БЦЖ-М, вакцинация против вирусного гепатита В, пневмококковой инфекции - полностью; АКДС-V2, в дальнейшем не привит в связи с отказом родителей). Посещает детский сад,

карантина нет, в семье все здоровы, других детей нет. Состояние удовлетворительное. Вес-22 кг. Рост-112см. Самочувствие не нарушено. Температура тела - 36,8°C. Кашель приступообразный, спазматический, до 6 приступов в сутки, сопровождается свистящим звуком на вдохе, с отхождением вязкой стекловидной мокроты в конце приступа, гиперемией лица. Слизистая полости рта обычной окраски, задняя стенка глотки умеренно гиперемирована, миндалины гипертрофированы 2 степени, налетов нет. Язык умеренно обложен. Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание жесткое, хорошо проводится во все отделы, хрипов нет. Тимпанический оттенок перкуторного звука, ЧД - 22 в минуту. Тоны сердца звучные, ритмичные. ЧСС - 94 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Стул, диурез – без особенностей.

Вопрос:

1. Какой клинический диагноз наиболее вероятен?
2. Какие исследования необходимо провести в амбулаторных условиях для подтверждения диагноза?
3. Какие средства специфической профилактики применяются?

Ответ:

1. Коклюш, типичная форма, период судорожного (спазматического кашля)
2. В условиях бокса поликлиники
 - ✓ клинический анализ крови,
 - ✓ ПЦР мазков с задней стенки глотки на ДНК *Bordetellae pertussis*, *Bordetellae parapertussis*, *Bordetellae bronchiseptica*,
 - ✓ Кровь на ИФА на антитела класса *IgM* (на ранних сроках), *IgA* и *IgG* (на поздних сроках) к *B. pertussis* или реакцию агглютинации (РА) к *B. pertussis* и *Bordetellae parapertussis*
3. Цельноклеточная вакцина АКДС, бесклеточные (ацеллюлярные) вакцины Инфанрикс, Инфанрикс-Гекса, Пентаксим, ацеллюлярная вакцина с уменьшенным количеством дифтерийного и столбнячного анатоксина для ревакцинаций детей старше 6 лет и взрослых.

**Лист согласования
дополнений и изменений
к комплекту ФОС_д/ ФОС_п / ФОС_{гИА} на _____ учебный год**

Дополнения и изменения к комплекту ФОС_д / ФОС_п / ФОС_{гИА} на
_____ учебный год по дисциплине _инфекционные
болезни _____ /
практике _____ /
государственной итоговой аттестации
по специальности _инфекционные болезни _____

В комплект ФОС_д / ФОС_п / ФОС_{гИА} внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте ФОС_д / ФОС_п / ФОС_{гИА} обсуждены на заседании
кафедры _____
« _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____).

Заведующий кафедрой (для ФОС_д / ФОС_п) _____ /
Заведующий профильной кафедрой (для ФОС_{гИА}) _____ / _____ /